

TAJO

INTERNACIONAL

Guía de las principales especies de fauna y flora



JUNTA DE EXTREMADURA



Guía
de las principales especies
de fauna y flora del

TAJO
internacional



Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura



Tajo-Tejo Internacional
Reserva de Biosfera desde 2016
Programa sobre el Hombre
y la Biosfera

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio

EDITA:
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

DISEÑO E ILUSTRACIÓN:
Antonio Grajera Moreno

TEXTOS:
María José Moralo Rodríguez, Noel Vega Vinagre
Carlos González Villalba, Diego Fernández Mateos
y Alfredo Anega Morales

MAQUETACIÓN:
Juan Carlos Conde

IMPRESIÓN:
Gráficas Romero

SUMARIO

AVES	9-39
INSECTOS (Libélulas y mariposas)	40-41
ANFIBIOS Y REPTILES	42-47
MAMÍFEROS	48-52
PECES	53-55
FLORA	56-79



USO DE LA GUÍA

Esta guía se ha concebido como una herramienta divulgativa y educativa que ayude al conocimiento de los principales valores naturales que alberga el Tajo Internacional.

Se trata de una guía didáctica dirigida al público en general que recoge una selección de las principales especies de flora y fauna de este singular espacio transfronterizo, agrupadas en seis categorías, cinco de fauna y una de flora. Se han seleccionado un total de 159 especies, consideradas las más representativas del área protegida y que pueden ser fácilmente identificadas a partir de los textos e ilustraciones de esta guía.

Cada especie recoge una pequeña descripción de sus rasgos identificativos más relevantes y del hábitat que ocupa.

Se incluye además información relativa al grado de amenaza regional y nacional (representada con la simbología que figura más abajo) y una gráfica en que se indican las fechas óptimas para la observación de la especie (en sombreado de color verde) y periodo de floración, en el caso de las especies vegetales (en sombreado de color amarillo). Los textos se acompañan de ilustraciones a color con el aspecto más representativo de cada especie. Para el caso de las aves, y en concreto de aquellas en las que el plumaje de ambos sexos es diferente, se ha optado por incluir el del macho, ya que suelen presentar rasgos más distintivos que las hembras. No se han considerado las variaciones de plumaje que algunas aves presentan en invierno, pudiendo llegar a ser bastante diferente al que exhiben en el periodo nupcial, o los plumajes de los ejemplares jóvenes.

A lo largo de la guía se emplean los siguientes símbolos y abreviaturas:

L - Longitud **E** - Envergadura **O** - Orden **F** - Familia

IE De Interés Especial (Catálogo Regional de Especies Amenazadas)

V Vulnerable (Catálogo Regional de Especies Amenazadas)

SAH Sensible a la Alteración de su Hábitat (Catálogo Regional de Especies Amenazadas)

PE En Peligro de Extinción (Catálogo Regional de Especies Amenazadas)

IE Incluido en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial

V Vulnerable (Catálogo Español de Especies Amenazadas)

PE En Peligro de Extinción (Catálogo Español de Especies Amenazadas)

EL TAJO INTERNACIONAL

Este enclave, reconocido internacionalmente bajo las figuras de Parque Internacional y Reserva de la Biosfera Transfronteriza por su excepcional patrimonio natural y cultural, representa uno de los retos más ambiciosos de la conservación en la península ibérica.

El Tajo Internacional es un territorio de especial relevancia situado en la región occidental de la península ibérica, compartida entre España y Portugal, que tiene como eje principal el curso del río Tajo. Se trata de un área de baja altitud, pero de relieve escarpado como consecuencia del encajamiento del Tajo y sus principales afluentes (Sever, Pónsul, Aravil, Salor y Erjas) en el borde de la penillanura.


Este área natural constituye un sector muy representativo del ecosistema mediterráneo donde se ha venido realizando una explotación racional y sostenida de los recursos naturales, lo que ha permitido el mantenimiento de una elevada biodiversidad (aquí encuentran refugio alrededor de 300 especies de nuestra fauna mediterránea más representativa) y unos activos patrimoniales, culturales y etnográficos particularmente valiosos y singulares de marcado carácter fronterizo.

Todos estos valores se encuentran reconocidos en ambos países bajo diferentes figuras de protección:

- **Reserva de la Biosfera Transfronteriza del Tajo-Tejo Internacional** (2016).
- **Parque Internacional Tajo/Tejo** (2012).
- **Parque Natural del Tajo Internacional en Extremadura** (2006).
- **Parque Natural do Tejo Internacional en Portugal** (2000).
- Y un importante número de lugares incluidos en la **Red europea Natura 2000**: 9 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 14 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en España, y 1 Zonas de Proteção Especial (ZPE) en Portugal.

El excelente grado de conservación de los valores naturales y culturales, unido a una estrecha historia de cooperación entre España y Portugal, hacen de este enclave **un excelente lugar para experimentar estrategias de desarrollo sostenible** cuyo objetivo sea armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural y el desarrollo económico y social a través de la relación de las personas con la naturaleza.

ESPAÑA-PORTUGAL



Guía

de las
principales especies de

fauna



Abejaruco europeo

Merops apiaster

DESCRIPCIÓN

Ave del tamaño de un zorzal común (L: 27-29 cm, E: 44-49 cm), claramente distinguible por sus llamativos colores con las partes dorsales rojizas, amarillas y verdosas, y zonas inferiores verdosas y azuladas. Además destaca su garganta amarilla, delimitada por una línea inferior y un antifaz negro. El iris es de color rojo sangre. Su dieta se basa en insectos que atrapa al vuelo, principalmente abejas, avispas, moscardones y libélulas.

HÁBITAT

Su hábitat es muy variado, pero suele concentrarse en lugares donde existen cortados, taludes o paredes verticales de consistencia arenosa donde construye su nido.



O: Coraciiformes. F: Meropidae. 

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Abubilla

Upupa epops

O: Coraciiformes. F: Upupidae. 

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN

Ave de aspecto inconfundible, con tonos ocre en la mitad anterior del cuerpo, y listas negras y blancas en la mitad posterior. Luce en su cabeza una llamativa cresta, de color ocre y con las puntas negras, que suele desplegar al posarse, cuando está inquieta o durante el cortejo. Tiene el pico largo y ligeramente curvado, y una cola amplia y negra, atravesada por una banda blanca. Se alimenta sobre todo de las larvas y pupas de insectos que se encuentran enterrados o entre la hojarasca. Busca el alimento sondeando con el pico en el suelo, como haría un ave limícola.



HÁBITAT

Muestra preferencia por las formaciones boscosas abiertas, siempre y cuando no superen los 1.000 m de altitud, como dehesas de encinas, alcornoques, robles melojos, fresnos, etc.

Águila imperial ibérica

Aquila adalberti



DESCRIPCIÓN

Rapaz de tamaño ligeramente inferior al águila real (L: 75-84 cm, E: 180-215 cm). Plumaje de color uniformemente pardo oscuro, con hombros blanquecinos, y nuca y lados del cuello pálidos. En vuelo destacan los hombros blancos y la base de la cola pálida sobre el resto del plumaje oscuro. Pico muy poderoso. Cola mediana y algo estrecha, plegada en vuelo. Su dieta se basa principalmente en conejos y palomas torcaces, aunque también se alimenta de liebres, perdices, passeriformes y algunos reptiles.

HÁBITAT

Puede observarse en sierras, llanuras y riberos. Nidifica en grandes árboles de zonas de bosque y matorral mediterráneo y dehesas.

O: **Falconiformes**. F: **Accipitridae**.  

E F M A M y J J I A S O N D

Águila real

Aquila chrysaetos



DESCRIPCIÓN

Rapaz de gran tamaño y la mayor de las águilas ibéricas (L: 76-96 cm, E: 180-230 cm). El adulto luce coloración general parda muy oscura, con tonos más dorados en las alas, la nuca y el cuello. Su silueta, muy proporcionada, queda definida por unas alas largas y anchas, de borde posterior muy redondeado

y una cola larga. El joven del año es casi negro, y cuando vuela destacan sendos parches blancos en las alas y una amplia zona blanca en gran parte de la cola, rematada por una banda terminal negra. Su dieta, muy variada, incluye mamíferos (sobre todo conejos y liebres), aves (palomas y perdices predominantemente) y reptiles. Además, consume carroña.

HÁBITAT

Está asociada fundamentalmente a zonas de montaña o lugares con relieve accidentado y presencia de cortados rocosos y cantiles donde nidificar.

O: **Falconiformes**. F: **Accipitridae**.  

E F M A M y J J I A S O N D

Águila pescadora

Pandion haliaetus



DESCRIPCIÓN

Rapaz de mediano tamaño (L: 53-66 cm, E: 147-174 cm). Los adultos poseen partes inferiores blancas con un moteado variable en el pecho y en contraste, partes superiores muy oscuras. Presentan pileo (parte superior de la cabeza) de color blanco, y tras el ojo, una lista ocular a modo de antifaz. El joven es muy similar, pero sus partes superiores parecen como escamadas debido al borde pálido en las plumas. Alimentación exclusivamente piscícola.

HÁBITAT


Están muy ligadas al medio marino; crían en acantilados y pescan en zonas cercanas. Los individuos migratorios o invernantes aparecen en diversos complejos acuáticos: bahías, lagunas interiores, embalses y estuarios.

O: **Falconiformes**. F: **Pandionidae**.  

E F M A M y J J I A S O N D

Águila perdicera

Aquila fasciata



DESCRIPCIÓN

Rapaz ágil y esbelta, algo menor que la real (L: 60-70 cm, E: 150-170 cm). Las partes superiores son pardo oscuro con mancha blanca en la espalda entre los hombros y en vuelo y por abajo, se observa una banda negra en las alas y final de la cola que los caracteriza, contrastando con el vientre blanco con estrías negruzcas. La hembra tiene mayor tamaño. Los juveniles presentan un diseño de plumaje donde dominan los tonos rojizos. Su alimentación está basada en aves de tamaño medio como paloma, perdiz roja o grullas, mamíferos y, en menor medida, reptiles.

HÁBITAT

Ave típica de los paisajes mediterráneos que prefiere zonas de clima seco y cálido con relieve accidentado pero evitando la alta montaña. Nidifica en paredes y cantiles rocosos y en ocasiones en plataformas sobre árboles e incluso sobre torretas eléctricas.

O: **Falconiformes**. F: **Accipitridae**.  

E F M A M y J J I A S O N D

Aguilucho cenizo

Circus pygargus



O: Falconiformes. F: Accipitridae. SAH IE

E F M A M J J A S O N D

DESCRIPCIÓN

Rapaz de mediano tamaño (L: 39-46 cm, E: 102-116 cm) y formas particularmente esbeltas, con alas largas, estrechas y relativamente puntiagudas, y cola muy larga. Resulta más grácil y estilizado que el aguilucho pálido por su menor tamaño. Ambos sexos exhiben plumajes radicalmente diferentes, los machos son bastante claros mientras que las hembras, considerablemente mayores y más pesadas, lucen tonos parduscos. La dieta de esta rapaz es bastante variada, compuesta de ratones y topillos, abundantes lagartijas, culebras y aves pequeñas y medianas, que complementa con grandes cantidades de insectos, sobre todo langostas y saltamontes.

HÁBITAT

Vive en grandes extensiones abiertas y está particularmente ligada a los cultivos de cereal. Nidifica en el suelo.

Águila calzada

Aquila pennata



DESCRIPCIÓN

Rapaz estilizada de tamaño medio, siendo la más pequeña de las águilas ibéricas (L: 42-51 cm, E: 110-135 cm). Puede adoptar dos fases de coloración diferentes en su plumaje, una llamada fase clara o pálida y otra llamada fase oscura. Por encima ambas fases son iguales, pero por debajo se aprecia como en la fase blanca (más abundante) tiene el pecho y el vientre blancos, cola grisácea y alas con banda negra en el extremo. La fase oscura presenta tonos acastañados en el vientre y cola marrón grisácea. Cuenta con una cabeza ancha y redonda, que presenta un pico poderoso para despedazar a sus presas. La hembra incubadora que habitualmente consta de dos huevos y su dieta se centra principalmente en aves de tamaño medio, aunque también consume conejos, lagartos ocelados, incluso en época de escasez grandes insectos.

HÁBITAT

Zonas arboladas con áreas despejadas cercanas donde poder caza.

O: Accipitriformes. Accipitridae. IE

E F M A M J J A S O N D

Aguilucho pálido

Circus cyaneus



O: Falconiformes. F: Accipitridae. SAH IE

E F M A M J J A S O N D

DESCRIPCIÓN

Rapaz de tamaño medio (L: 45-55 cm, E: 97-118 cm), ligeramente mayor que el aguilucho cenizo y con las alas más anchas. Presenta gran dimorfismo sexual. Macho de tonos grisáceos en las partes superiores y blancos en el obispillo y en el vientre. Hembra mayor que el macho, de color marrón oscuro con vientre ocre manchado. Se alimenta de roedores, aves de pequeño tamaño, reptiles, y grandes insectos que captura a ras de suelo.

HÁBITAT

Aparece en espacios abiertos desprovistos de arbolado (pastizales y cultivos cerealistas principalmente). Nidifica en el suelo.

Alcaraván

Burhinus oedicnemus



DESCRIPCIÓN

Ave esteparia del tamaño de una paloma grande (L: 38-45 cm de longitud, E: 76-88 cm). Macho y hembra de aspecto muy similar con plumaje pardo, rayado de negro en la parte superior y blancuzco con sutiles listas oscuras en la parte inferior. Las alas muestran dos bandas blancas en vuelo y una con el ave posada. Posee grandes ojos de color amarillo, al igual que las patas y parte del pico que además presenta la punta negra. Suele agacharse para pasar inadvertida, camuflándose perfectamente gracias a su plumaje, aunque en época de cría se detecta con menor dificultad al emitir un característico reclamo en horas crepusculares. Nidifica en una depresión en el suelo entre piedras.

Se alimenta principalmente de insectos e incluye a veces en su dieta pequeños vertebrados.

HÁBITAT

Propia en general de ambientes esteparios. Ocupa terrenos llanos o ligeramente ondulados, poco o nada arbolados. En las llanuras cerealistas ocupa los barbechos.

O: Caradriformes. F: Burhinidae. V IE

E F M A M J J A S O N D

Alcaudón real

Lanius meridionalis



O: Passeriformes. F: Laniidae.  

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN

Es el mayor de todos los alcaudones de la Península Ibérica (L: 24-25, E: 28-34 cm). El plumaje del dorso y de la cabeza es de color gris plumizo y el de la zona ventral blanco-rosado. Las alas, al igual que la larga cola, son negras y presentan una distintiva mancha blanca. Posee una franja negra en la cabeza a modo de antifaz, finas cejas blancas y un pico robusto negruzco de extremo ganchudo. Los juveniles muestran un plumaje ligeramente moteado por abajo. Caza al acecho, desde postes o ramas altas de arbustos y emplaza el nido en arbolillos o en arbustos densos, habitualmente pinchudos. Su dieta es muy variada y está compuesta por grandes insectos, ratones, topillos, pajarillos y reptiles. Con frecuencia genera despensas empalando sus presas en arbustos o alambradas.

HÁBITAT

Ocupa zonas abiertas, con árboles y arbustos dispersos.

Alcaudón común

Lanius senator

DESCRIPCIÓN

Ave de tamaño medio, menor que el alcaudón real (L: 18 cm, E: 26-28 cm) que se caracteriza por el color rojizo de la nuca y la parte superior de la cabeza, y el antifaz negro que cubre la frente y los ojos. Su dorso es negro con manchas blancas en hombros y alas, y la parte ventral blanquecina. Posee la cola larga y el pico ancho, corto, negro y ganchudo, más propio de una rapaz. La hembra presenta coloración similar aunque más apagada, mientras que los juveniles tienen tonos parduzcos.



Suele posarse en arbustos, vallas o muros, desde donde se lanza para cazar insectos, que clavan en espigas cuando le sobran. Completa su dieta con pequeños mamíferos y reptiles. Construyen sus nidos en forma de taza sobre arbustos o pequeñas chaparras y la hembra incuba los huevos mientras el macho la alimenta.

HÁBITAT

Típica de paisajes mediterráneos abiertos, con arbolado y matorral disperso.

O: Passeriformes. F: Laniidae.  

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Anátidas

Ánade real o azulón. *Anas platyrhynchos*

O: Anseriformes. F: Anatidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

(L: 55 cm.) El plumaje del macho destaca por el color verde brillante de la cabeza y cuello. Además posee un collar blanco separando el pecho castaño del cuello. En vuelo muestran en las alas una distintiva franja azulada.



Cuchara común. *Anas clypeata*

O: Anseriformes. F: Anatidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

(L: 51 cm.) Inconfundible por la forma aplanada de su largo y especializado pico, de cuya semejanza con una cuchara proviene el nombre vulgar de la especie. Frecuenta lagunas, embalses, y marismas, siempre que cuenten con abundante vegetación acuática y aguas someras.



Ánade friso. *Anas strepera*

O: Anseriformes. F: Anatidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

(L: 51 cm.) Ánade esbelta, algo menor que el azulón con plumaje bastante apagado y uniforme, con la popa negra y el espejuelo blanco. Frecuenta lagunas, embalses, marismas y estuarios.



Cerceta común. *Anas crecca*

O: Anseriformes. F: Anatidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Es el más pequeño de los patos (apenas 35 cm). Cabeza de un intenso color castaño, con una especie de antifaz de color verde intenso ribeteado de tonos ocre. Presenta una lista blanca por encima de las alas y ambos sexos tienen un espejuelo de color verde y negro. Se reparten por todo tipo de zonas húmedas.





Alimoche

Neophron percnopterus

DESCRIPCIÓN

Ave de tamaño entre mediano y grande (L: 55-65 cm, E: 148-171 cm) y aspecto inconfundible. Los ejemplares adultos lucen un plumaje mayoritariamente blanco sucio, con regiones teñidas de crema, y algunas plumas alares completamente negras. El plumaje de los jóvenes es pardo oscuro y a lo largo de sucesivas mudas, va pasando por diferentes colores hasta que, a los 5 años, alcanzan el definitivo. La cara y la garganta carecen de plumas y son de un llamativo color amarillo en los adultos. Posee carácter netamente carroñero, aunque ocasionalmente, puede capturar pequeños vertebrados e insectos.

HÁBITAT

Ocupa gran cantidad de hábitats, siempre que en ellos encuentre algún cortado o escarpe rocoso en el que instalar su nido.

O: Falconiformes. F: Accipitridae.  

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

Autillo

DESCRIPCIÓN

Es la más pequeña de nuestras rapaces nocturnas (L: 19-21 cm, E: 47-54 cm). Su plumaje, de grisáceo a pardo rojizo, manchado y barrado de pardo oscuro, le proporciona un excelente camuflaje. Sobresalen de su cabeza dos pequeños penachos a modo de "orejas". Presenta disco facial y ojos amarillo brillante. Generalmente pasa las horas de luz oculto y caza a la caída de la tarde y durante la noche; en días nublados puede verse de día. Su canto es parecido al del Sapo de espuelas. Nidifica en huecos de árboles, edificios o roquedos, pero también en nidos abandonados de córvidos. Su alimentación es fundamentalmente insectívora, aunque también consume lagartijas, pajarillos y pequeños mamíferos.

HÁBITAT

Selecciona preferentemente áreas boscosas, evitando tanto zonas densas como desarboladas.

O: Strigiformes. F: Strigidae.  

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---



Otus scops

Arrendajo

Garrulus glandarius

DESCRIPCIÓN

Ave del tamaño de una paloma torcaz (L: 32-35 cm, E: 54-58 cm) y aspecto inconfundible por el colorido del plumaje, en el que destaca el azul turquesa rayado de negro y blanco de sus alas. Cabeza con la parte superior listada de blanco y negro, bigotera negra y garganta blanca. El obispillo es blanco y contrasta mucho con la cola larga y negra. En primavera y verano, se alimenta de insectos, pequeños reptiles, roedores y huevos de otras aves. El resto del año su dieta se basa en frutos, que suele enterrar para disponer de ellos en la época más desfavorable.

HÁBITAT

De comportamiento eminentemente forestal, requiere de bosques densos y extensos.

O: Passeriformes. F: Corvidae.  

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

Avutarda

DESCRIPCIÓN

Ave inconfundible de gran tamaño (L: 75-105 cm, E: 190-260 cm), de cabeza y cuello gris pizarroso, dorso pardo rojizo rayado de negro y partes inferiores de color blanco. Barbas eréctiles blancas durante el celo en el macho. Se trata de una de las aves voladoras más pesadas (hasta 18 kg), de vuelo pausado y pecho voluminoso. Su alimentación es omnívora, incorporando tanto vegetales como animales (insectos principalmente), alternando estos según su existencia en los distintos periodos estacionales.

HÁBITAT

Habita áreas pseudoesteparias derivadas de un régimen agroganadero tradicional (siembras, rastrojos, labrados, posíos, pastizales, ...)

O: Gruiformes. F: Otidae.  

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---



Otis tarda


DESCRIPCIÓN

Ave de pequeñas dimensiones (L: 13,4-15 cm, E: 26-32 cm), con plumaje de cabeza, dorso y alas negro azulado, en contraste las partes inferiores y un gran obispillo completamente blancos. Cola ligeramente ahorquillada.

Ave estival colonial, que localiza sus nidos habitualmente en aleros y fachadas de viviendas, así como bajo puentes, pudiendo también constituir colonias en cantiles rocosos. Construye nidos de barro reforzados con materiales vegetales, con forma semiesférica, adherido a una pared y/o techo, con una pequeña entrada superior.

Se alimenta de insectos voladores de pequeño tamaño que captura habitualmente con vuelos a una altura intermedia entre las utilizadas por las golondrinas (zona baja) y los vencejos (zona alta).

Vuela habitualmente a mayor altitud que las golondrinas y a menor altitud que los vencejos. Ave muy cantarina que emite reclamos secuenciados con timbre suave.

O: Passeriformes. F: Hirundinidae.  

E F M A M J J A S O N D

Avión roquero
Ptyonoprogne rupestris

DESCRIPCIÓN

El más compacto de los hirundinidos (L: 14-15 cm, E: 30-35 cm.), con cuerpo y cuello ancho y alas anchas y puntiagudas. Partes superiores gris parduzco, con alas más oscuras que el resto. Cola corta, ligeramente escotada, de color pardo oscuro y franja de manchas blancas en la parte final de la misma. Pecho pardo claro, con la garganta listada de oscuro. Ave sedentaria o con movimientos migratorios invernales de corta distancia. Localiza sus nidos fundamentalmente en el interior de cuevas y cavidades rocosas, utilizando en menor medida edificios, principalmente antiguos. Realiza nidos de barro reforzados con materiales vegetales, con forma de cuenco adosado a las paredes.

Vuelo potente, habitualmente en torno a cantiles rocosos o edificios antiguos. Su alimentación está basada en insectos voladores de pequeño tamaño que captura cerca del nido con planeos y vuelos lentos. Este avión es menos vocal que otros hirundinidos, emite reclamos y trinos simples y suaves.

O: Passeriformes. F: Hirundinidae.  

E F M A M J J A S O N D

DESCRIPCIÓN

Ave de pequeño tamaño (L: 17-21 cm, E: 32-36 cm) con plumaje de las partes superiores azul oscuro metálico y las partes inferiores claras, de blancas a anaranjadas, destacando una banda pectoral negra. Frente y garganta-mentón castaño rojizo. Su cola es ahorquillada, con las rectrices externas muy alargadas, especialmente en el caso de los machos, y con puntos blancos en la parte inferior. El vuelo es más batido que los vencejos, con menos planeos y menos prolongados.

Ave estival reproductora más frecuente en zonas agrícolas y/o ganaderas. Nidifica en edificaciones, construyendo nidos de barro reforzados con materiales vegetales con forma de cuenco.

Se alimenta de insectos que caza en vuelos bajos, en ocasiones a ras de suelo. Su canto consiste en un parloteo musical y acelerado, encadenando gorjeos con otros sonidos desde ásperos a agudos.

O: Passeriformes. F: Hirundinidae.  

E F M A M J J A S O N D


Golondrina dáurica
Cecropis daurica
DESCRIPCIÓN

De aspecto y medidas similares a la golondrina común (L: 14-19 cm, E: 30-35 cm.). Los rasgos más distintivos de la especie son la nuca, cara y obispillo, de color anaranjado. La parte inferior de las alas también muestra zonas anaranjadas. Cola larga y muy ahorquillada, de color negro.

Golondrina con presencia estival, menos vinculada a las construcciones humanas. Nidifica en cavidades rocosas naturales, aunque también bajo puentes, edificios abandonados, y en menor medida, en viviendas. Nidos muy característicos, de barro reforzados con materiales vegetales, consistentes en una semiesfera con un túnel de entrada, y adheridos horizontalmente a un techo o extraplomo.

Se alimenta de insectos que captura con vuelos más lentos y planeando más que la golondrina común. Emite un gorjeo más corto y suave que esta, intercalando con reclamos similares a los de gorrión y escribanos.

O: Passeriformes. F: Hirundinidae.  

E F M A M J J A S O N D



Vencejo cafre

Apus caffer



DESCRIPCIÓN

Vencejo pequeño (L: 14-15,5 cm, E: 33-37 cm.) con alas proporcionalmente más largas y cola muy ahorquillada. Plumaje uniformemente negro, excepto la garganta y una banda estrecha del obispillo, que son de color blanco. Las puntas de las plumas secundarias (dorso del ala) son de color blanquecino y la frente y cejas de color grisáceo.

Reproductora habitual al sur del Sáhara, estando presente en el norte de África y suroeste de la Península Ibérica desde tiempos recientes, nidificando en época estival de forma dispersa en cortados fluviales y de sierras y en menor medida bajo puentes. Usurpa los nidos de otros hirundinidos, especialmente de golondrinas dáuricas. Reclama con una menor intensidad y frecuencia que el resto de los vencejos, con un canto similar a un gorjeo.

O: Apodiformes. F: Apodidae.  

E F M A M J J A S O N D

Vencejo común

Apus apus



DESCRIPCIÓN

Ave de medianas dimensiones (L: 17-18,5 cm, E: 40-44 cm.). Su plumaje es oscuro, algo más claro en la parte inferior de las alas, con garganta-mentón pálido. Realiza largos planeos intercalados con cortos e intensos batidos de alas. Vuelan habitualmente en grupos denominados "carruseles", emitiendo estridentes reclamos que constituyen uno de los sonidos más típicos en pueblos y ciudades durante el periodo estival, coincidiendo con su periodo de cría. Recorre anualmente aproximadamente 20.000 km en sus viajes migratorios entre sus zonas de reproducción e invernada.

O: Apodiformes. F: Apodidae.  

E F M A M J J A S O N D

Vencejo pálido

Apus pallidus



DESCRIPCIÓN

Ave algo menor que el vencejo común (L: 16-18 cm, E: 39-44 cm.), con cuerpo más rechoncho, alas, cabeza y cuello ligeramente más ancho. Plumaje del cuerpo meno oscuro que el vencejo común, con las partes inferiores con colores pardos intercalados a modo de escamas y cabeza y garganta con mayor superficie clara. Realiza planeos más largos y aleteos más pausados que el vencejo común y posee un reclamo similar, aunque más seco, grave y mecánico, claramente disilábico.

Se encuentra presente como ave reproductora durante el periodo estival, aunque existen pequeñas poblaciones invernantes en algunas localidades de Andalucía y Extremadura. Su periodo de reproducción es más extenso que el vencejo común y la migración otoñal más tardía.

O: Apodiformes. F: Apodidae.  

E F M A M J J A S O N D

Vencejo real

Apus melba



DESCRIPCIÓN

Vencejo inconfundible por su gran tamaño, el mayor del grupo (L: 20-23 cm, E: 51-58 cm.), su plumaje contrastado (vientre y garganta de color blanco, con alas, dorso, cola y una franja pectoral de color gris oscuro) y su vuelo más lento, con profundos aleteos. Puede llegar a confundirse con una pequeña rapaza, como el alcotán.

Reclamo diferenciado de los demás vencejos, con un trino largo, lento y agudo, con frecuentes cambios de ritmo, bajando el tono al final.

O: Apodiformes. F: Apodidae.  

E F M A M J J A S O N D

Búho real

Bubo bubo



O: Strigiformes. F: Strigidae. IE IE

E F M A M J J A S O N D

DESCRIPCIÓN

Es la mayor de las rapaces nocturnas europeas (L: 57-75 cm, E: 140-188 cm), siendo mayores las hembras que los machos. Posee un plumaje en el que predominan los tonos leonados y pardos, más oscuro por encima y más claro en la zona ventral, con listas y un fino barrado. Poderosas garras y alas largas y redondeadas, con un vuelo poderoso y rectilíneo. Cabeza rematada por largos penachos a modo de "orejas" resaltando unos bellos ojos anaranjados. Puede capturar una enorme variedad de vertebrados, desde conejos, córvidos y aves acuáticas, hasta erizos, gatos, e incluso otras rapaces. Nocturna, fuertemente territorial y de carácter reservado y solitario.

HÁBITAT

Puede instalarse en los más diversos hábitats, aunque prefiere las zonas bravías con abundantes roquedos, tajos fluviales y cortados.

Buitre negro *Aegypius monachus*

DESCRIPCIÓN

Rapaz más grande de Europa (L: 100-115 cm, E: 265-290 cm). Posee plumaje de color uniforme pardo muy oscuro. El pescuezo se encuentra totalmente desnudo, mientras que la cara y la parte superior de la cabeza aparecen cubiertas por plumón. Llama la atención en la base del cuello un collar de plumas cortas y pálidas. En vuelo es majestuoso, con alas largas, anchas y de bordes rectos. Su cola es corta, en forma de cuña y algo mayor que la del buitre leonado. Ambos padres comparten la incubación del único huevo, la defensa del nido y el cuidado del pollo. Se alimenta de carroña. Detecta pequeñas carroñas prospectando meticulosamente el terreno a una altura inferior que el buitre leonado.

HÁBITAT

Vive en lugares difícilmente accesibles y cerca de pastizales, dehesas o terrenos extensos de monte bajo, donde abunde la caza mayor y menor, anidando en árboles de gran porte en laderas poco transitadas.



O: Falconiformes. F: Accipitridae. SAH V

E F M A M J J A S O N D

Buitre leonado

Gyps fulvus



O: Falconiformes. F: Accipitridae. IE IE

E F M A M J J A S O N D

DESCRIPCIÓN

Rapaz mayor que un águila aunque de menor tamaño que el Buitre negro (L: 95-110 cm, E: 230-265 cm). Presenta coloración marrón pálida, con las plumas de vuelo y de la cola más oscuras. La cabeza y el largo cuello están tan sólo cubiertos de plumón blanco y un collar de plumas blancas en la base del cuello. Inmaduros similares a los adultos pero algo más oscuros y rojizos. Visto en vuelo, mientras planea, ofrece una silueta inconfundible con las alas anchas y con dedos muy largos, y una cola corta y redondeada. Se alimenta de carroñas, fundamentalmente de medianos y grandes ungulados.

HÁBITAT

Habitualmente ligado a desniveles rocosos próximos a claros y áreas boscosas con ganado en régimen extensivo. Suele nidificar en colonias en repisas y cantiles, y excepcionalmente en árboles.

Busardo ratonero

Buteo buteo

DESCRIPCIÓN

Rapaz diurna de tamaño mediano (L: 46-58 cm, E: 110-132 cm), complexión robusta y aspecto rechoncho cuando está posada. Plumaje muy variable desde tonos muy claros a muy oscuros, aunque generalmente presentan el dorso pardo y las partes inferiores claras, con estrías; las alas son oscuras, más claras por debajo y con las puntas de color oscuro. Sus alas en vuelo son relativamente cortas y muy anchas y la cola, que es oscura y no demasiado larga, frecuentemente se despliega en abanico para sostenerse. Es usual observarle al acecho posado en postes, árboles, salientes o estacas de cercados. La dieta es amplia, basada principalmente en micromamíferos, pero incluye también otros mamíferos, aves, reptiles, anfibios o insectos. Esporádicamente se comporta como carroñero.

HÁBITAT

Durante la nidificación ocupa zonas arboladas muy diversas, anidando en árboles y, en invierno, aumenta su presencia en territorios más despejados.



O: Falconiformes. F: Accipitridae. IE IE

E F M A M J J A S O N D

**DESCRIPCIÓN**

Ave ligeramente inferior a un gorrión (L: 14 cm, E: 22-25 cm) y fácilmente identificable por el color amarillo de su cuerpo que contrasta con el azul de las alas y la cola. Cabeza de color negro brillante, con las mejillas blancas. Los machos, a diferencia de las hembras, poseen una "corbata" negra muy marcada que llega hasta la base de la cola. Se alimenta principalmente de insectos, aunque en otoño incorpora frutos a su dieta.

HÁBITAT

Aunque su hábitat es forestal, aparece en diversidad de ambientes arbolados (bosques, dehesas, vegetación de ribera, matorral bajo y arbolado disperso, huertos, parques y jardines urbanos, etc.).

O: Passeriformes. F: Paridae.  

E F M A M J J A S O N D

**DESCRIPCIÓN**

Ave de mediano tamaño (L: 29-32 cm, E: 66-73 cm), aspecto compacto y cabeza y pico relativamente grandes para su tamaño. De aspecto inconfundible, destaca su plumaje azul metálico intenso, con el extremo de las alas oscuro y dorso castaño. Las voces durante los vuelos de celo se asemejan al sonido de una carraca. Se alimenta fundamentalmente de insectos (voladores y terrestres), y en menor medida, pequeños reptiles y anfibios.

HÁBITAT

Habita áreas abiertas con poca densidad de arbolado, utilizando huecos en árboles, construcciones humanas y taludes, o si se le proporciona, nidos artificiales.

O: Coraciiformes. F: Coraciidae.  

E F M A M J J A S O N D

O: Falconiformes. F: Falconidae.

Pequeños halcones que se "ciernen", manteniéndose suspendidos en el aire y batiendo sus alas puntiagudas hasta que se lanzan en picado sobre una presa. Las hembras son mayores que los machos y presentan coloración pardusca similar a la de los juveniles.

Cernícalo vulgar. *Falco tinnunculus*

E F M A M J J A S O N D  

Algo mayor que el primilla (L: 31-37 cm, E: 68-78 cm) y con las garras más oscuras. El dorso del macho es rojizo con manchas negras y en la zona ventral predominan los tonos crema; la cabeza es grisácea y algo rayada de negro. Se alimenta de micromamíferos, grandes insectos y diversos reptiles, y aves pequeñas y medianas. En general requiere de espacios abiertos para cazar.

Cernícalo primilla. *Falco naumanni*

E F M A M J J A S O N D  

Algo menor que el vulgar (L: 26-31 cm, E: 66-72 cm) y de garras más claras. Las partes superiores del macho son rojizas, sin listas negras y un área gris en las alas. La cabeza y la larga cola son de color gris-azulado. Partes inferiores de tono crema con tintes rosados y con pintas oscuras. Básicamente es insectívora. Habita en ambientes abiertos y anida en colonias principalmente en oquedades de construcciones.

**DESCRIPCIÓN**

Zancuda similar a la cigüeña blanca (L: 95-105 cm, E: 170-205 cm) pero con tonos oscuros predominantes. Cabeza, cuello, pecho, dorso y cola de color negro, con matices verdosos y púrpuras. Parte inferior del pecho y vientre blancos. Pico, anillo ocular y patas rojas. Se alimenta fundamentalmente de peces. Además incluye en su dieta anfibios, reptiles e invertebrados.

HÁBITAT

Ocupan para reproducirse dehesas y bosques diversos, valles, riberos y gargantas fluviales con cortados rocosos, y sierras con riscos de cumbre, siempre áreas con escasa presencia humana y cercanas a zonas de alimentación favorables.

O: Ciconiiformes. F: Ciconidae.  

E F M A M J J A S O N D



Collalba negra

Oenanthe leucura



DESCRIPCIÓN

Ave relativamente grande (L: 18 cm, E: 26-29 cm) y de aspecto inconfundible por su coloración muy oscura, con plumaje negro lustroso en los machos y marrón oscuro en las hembras. Sobre este fondo destacan el obispillo y la base de la cola de color blanco, que contrastan con una T invertida de color negro en el extremo de la cola, muy visible y característica en vuelo. Alimentación basada en el consumo de insectos (coleópteros, hormigas, etc.), que captura en el suelo.

HÁBITAT

Especie típica de ambientes áridos, desprovistos de vegetación y con presencia de escarpes rocosos o muros.

O: Passeriformes. F: Turdidae. IE IE

E F M A M J J A S O N D

Culebrera europea

Circaetus gallicus

DESCRIPCIÓN

Águila de tamaño considerable (L: 62-69 cm, E: 160-175 cm). Posee cabeza voluminosa, pico corto y robusto, patas gris-azuladas y grandes ojos amarillos. El plumaje de los adultos se caracteriza por tonos claros de las partes inferiores, con pecho y garganta de color pardo oscuro y moteado variable. El dorso, la cabeza, el cuello y el pecho del ave es de color pardo. La cola, bastante larga, tiene tres barras oscuras bien distintivas. Se alimenta fundamentalmente de reptiles, sobre todo culebras y algún la-



garto, sapos o perdices. Su destreza y las grandes escamas de sus patas le ayudan a evitar el veneno de determinadas especies que caza.

HÁBITAT

Masas forestales con media-alta cobertura de matorral alejadas de la presencia humana con zonas despejadas en las que pueda cazar. Ubica su pequeño nido en las copas de los árboles.

O: Accipitriformes. F: Accipitridae. IE IE

E F M A M J J A S O N D

Currucas

Las currucas son pequeñas aves de comportamiento nervioso e inquieto. Se alimentan principalmente de insectos, aunque también consumen bayas, frutos y semillas, sobre todo durante la migración. En la zona podemos encontrar:

Curruca cabecinegra. *Sylvia melanocephala*

O: Passeriformes. F: Sylviidae. IE IE

Similar en tamaño a un gorrión (L: 13-14 cm, E: 15-18 cm). Cabeza con capirote negro, garganta y parte inferior de los carrillos de color blanco y anillo ocular de color rojo. El plumaje de los machos es grisáceo por arriba y más pálido por debajo, mientras que el de las hembras es más discreto, con cabeza gris y dorso marrón. Ocupa todo tipo de matorrales.

E F M A M J J A S O N D



Curruca mirlona. *Sylvia hortensis*

O: Passeriformes. F: Sylviidae. IE IE

Es la mayor de las currucas presentes en Extremadura (L: 15 cm, E: 20-25 cm). Plumaje grisáceo en arriba y blanquecino por debajo, con tintes rosados en el pecho. Garganta blanca, "antifaz" negro, capirote gris oscuro y destacado ojo pálido. Su canto recuerda al mirlo, de ahí su nombre. Prefiere las dehesas de encinas y bosques abiertos cálidos.

E F M A M J J A S O N D



Curruca tomillera. *Sylvia conspicillata*

O: Passeriformes. F: Sylviidae. IE IE

Especie de pequeño tamaño (L: 12-13 cm, E: 13-17 cm). Plumaje del macho con tonos rosados en las partes inferiores, dorso pardo-grisáceo, cabeza grande de color gris azulada, garganta blanca y anillo ocular blanco. El de las hembras e inmaduros es más apagado y con tonos pardo-rojizos en la cabeza. Ocupa áreas más secas y abiertas donde haya presencia de matorral no muy denso.

E F M A M J J A S O N D



DESCRIPCIÓN

Pequeña rapaz (L: 34-36 cm, E: 65-70 cm) que presenta cabeza voluminosa y casi blanca, plumaje inferior muy claro con las puntas de las alas oscuras y puntiagudas. Por encima, espalda y alas de color gris pálido azulado y hombros negros. Sus ojos, de color rojo oscuro con una mancha negra alrededor y sus patas amarillas, destacan fuertemente sobre el blanco de sus partes inferiores. Suele cazar en horas crepusculares desde un posadero o en vuelo, realizando planeos y cerniéndose a menudo para caer repentinamente sobre su presa, método de caza que recuerda al del cernícalo. Cría en árboles relativamente bajos. Se alimenta de mamíferos pequeños, principalmente roedores, insectos, algunas aves y reptiles.

HÁBITAT

Habita en terrenos abiertos con árboles dispersos, zonas adeshadas y cultivos de cereales de secano, prefiriendo para invernar áreas de regadío.



O: **Falconiformes**. F: **Accipitridae**.

E F M A M J J A S O N D

DESCRIPCIÓN

Ave más pequeña y esbelta que la ganga ortega (L: 31-39 cm, E: 55 cm) y con las plumas centrales de la cola más largas y afiladas. Las hembras presentan dos bandas negras entre la garganta y el pecho mientras que los machos sólo una y poseen una mancha en el pecho de color marrón más pálido. Vientre y cara inferior de las alas blancos. Dorso pardo grisáceo y ocre. Lados de la cabeza anaranjados y lista en el ojo y garganta negras. Franja de color castaño bordeada de negro en el pecho. Su voz recuerda a una grujilla. Forma en invierno bandos de cientos de individuos y durante el período reproductor se disgregan en parejas. Nidifica en el suelo. Se alimenta casi en exclusiva de semillas de plantas herbáceas y

O: **Pteroclidiformes**. F: **Pteroclididae**.

E F M A M J J A S O N D

requiere un consumo regular de agua, concentrándose en bebederos.

HÁBITAT

Zonas abiertas formadas por pastizales y cultivos de cereal en secano aunque también presente en dehesas de escaso arbolado.



DESCRIPCIÓN

Rapaz robusta, de mediano tamaño (L: 38-51 cm, E: 89-113 cm), muy utilizada en cetrería. Hembras mayores que los machos. Los machos poseen las partes superiores color gris pizarroso, y las inferiores claras, con fino barrado horizontal. Tienen un corto pero poderoso pico y una extensa "bigotera" (mancha negra a los lados de las mejillas). Las hembras suelen presentar un barrado más tosco en el pecho y bigotera más ancha. En los jóvenes, predominan tonos pardos, con las partes inferiores ocre y listadas verticalmente. Las alas son más bien cortas, al igual que la cola, y puntiagudas. Es un especializado cazador de aves de varios tamaños a los que suele abatir en vuelo. El vuelo es veloz y poderoso.

HÁBITAT

Requiere de espacios abiertos para cazar e instalan el nido principalmente en cortados rocosos y edificios abandonados.

O: **Falconiformes**. F: **Accipitridae**.

E F M A M J J A S O N D

DESCRIPCIÓN

Ave similar en tamaño a la perdiz y mayor que la ganga ibérica (L: 34-36 cm, E: 65-70 cm). Abdomen negro, característica distintiva en vuelo. Alas largas y puntiagudas, blancas y negras por debajo. El macho presenta cabeza y cuello gris y garganta anaranjada con la base negra. Las hembras son más amarillentas, moteadas en la cabeza y en el dorso y con banda negra en la garganta. Suele verse a menudo en grupos. Nidifica en el suelo donde se mimetiza gracias a su plumaje. Se alimenta casi en exclusiva de semillas de plantas herbáceas y requiere un consumo regular de agua.

O: **Pteroclidiformes**. F: **Pteroclididae**.

E F M A M J J A S O N D

HÁBITAT

Zonas subestépicas de gramíneas y plantas anuales entre zonas de cultivos extensivos de cereal de secano, pastizales o terrenos pedregosos.





DESCRIPCIÓN


Garza de mediano tamaño (L: 55-65 cm, E: 88-106 cm), de plumaje completamente blanco, con largas patas negras y dedos amarillos. Su pico es largo y negro con forma de daga. En vuelo adopta la característica silueta de las ardeidas, con el cuello recogido en forma de "S" y las patas sobresaliendo por detrás de la cola. Dieta basada en pequeños peces, anfibios e insectos acuáticos y terrestres. En menor medida, consume crustáceos, lagartijas, lombrices, caracoles, pequeños mamíferos y culebras.

HÁBITAT

Vive en todo tipo de humedales naturales o artificiales.

O: Ciconiiformes. F: Ardeidae.  

E F M A M J J A S O N D



DESCRIPCIÓN

Garza de pequeño o mediano tamaño (L: 45-52 cm, E: 82-95 cm) y formas bastante compactas, se caracteriza por tener el cuello, las patas y el pico relativamente cortos y por el color mayoritariamente blanco de su plumaje, en el que apenas se aprecian diferencias sexuales. Durante la época nupcial en los adultos predomina el color blanco, pero adornado con tonos anaranjados en parte superior de la cabeza. Especie con hábitos alimentarios bastante adaptados a las disponibilidades locales o temporales del medio. Entre sus presas predominan numerosos invertebrados, así como lagartijas, pequeñas culebras, anfibios y micromamíferos.

HÁBITAT

Sus hábitos resultan mucho menos acuáticos que los de otras especies del grupo. Suele frecuentar pastizales con abundante ganado, dehesas y cultivos cuando busca alimento, aunque también zonas encharcables y lagunas de poca profundidad.

O: Ciconiiformes. F: Ardeidae.  

E F M A M J J A S O N D

DESCRIPCIÓN

Ave grande y esbelta (L: 96-119 cm, E: 180-222 cm), de patas y cuello largos y coloración general gris ceniza, más oscura hacia el extremo de las alas. En adultos destaca un penacho de plumas colgantes a modo de cola. En la cabeza, de color negro, destacan el píleo rojo y unas franjas blanquecinas a ambos lados que se extienden desde los ojos hasta el cuello. Vuelan con el cuello y las patas estiradas y en bandadas, reconocibles por la característica formación en "V" que adoptan. Se alimenta,



sobre todo, de materia vegetal variada que se completa con el consumo de invertebrados principalmente durante el desarrollo de los pollos y en los primeros meses de la invernada consume casi exclusivamente bellotas.

HÁBITAT

En invierno, las bandadas se concentran durante el día para alimentarse especialmente en dehesas y cultivos. A la caída de la tarde, abandonan estos enclaves y se dirigen a los dormideros ubicados sobre todo en embalses.

O: Gruiformes. F: Gruidae.  

E F M A M J J A S O N D

DESCRIPCIÓN

Ave de gran tamaño (L: 84-102 cm, E: 155-175 cm), la mayor de las ardeidas que frecuentan nuestro país, de figura estilizada, largo cuello y coloración general grisácea. En vuelo adopta la postura característica de las garzas, con el cuello encogido en forma de "S" y las patas sobresaliendo por detrás de la cola, si bien la garza real resulta fácilmente diferenciable del resto debido a su gran tamaño. Su alimento básico lo constituyen los peces, pero también incluye en su dieta una gran variedad de vertebrados crustáceos, moluscos, lombrices, grandes insectos e, incluso, materia vegetal.

HÁBITAT

Habita en lagunas, marismas o riberas de agua dulce, siempre que cuenten con vegetación emergente y arbolado próximo en el que instalar sus nidos. Durante el invierno, ocupa todo tipo de humedales, naturales o artificiales, así como pastizales, o prados.



O: Ciconiiformes. F: Ardeidae.  

E F M A M J J A S O N D



O: Passeriformes. F: Paridae.  

E F M A M J J A S O N D

DESCRIPCIÓN

Pájaro de pequeño tamaño (L: 11,5 cm, E: 17,5-20 cm) cuyas alas, cola y cabeza exhiben un bello color azulado, que se completa con un collar azul cobalto. El dorso posee tintes verdosos y las partes inferiores son amarillentas. Presenta mejillas de color blanco en los adultos y amarillo pálido en los volantones. Se alimenta de numerosos invertebrados (arañas, coleópteros, dípteros, larvas de lepidópteros, hemipteros, etc.). También picotea brotes e ingiere semillas y la pulpa de frutos carnosos (moras, higos, bayas de saúco, etc.).

HÁBITAT

Precisa de la existencia de arbolado y muestra preferencia por los bosques caducifolios aunque también es frecuente en bosques de frondosas perennes (encinares, alcornocales). Ocupa tanto formaciones abiertas como adehesadas, parques y huertos.

DESCRIPCIÓN

Ave de pequeño tamaño (L: 16-17 cm, E: 24-26 cm) y aspecto compacto, que se caracteriza por poseer uno de los más vistosos plumajes de nuestra fauna, dominando los colores azules y verdosos (brillantes y metálicos) en las regiones dorsales y los anaranjados en las ventrales. La cabeza parece desproporcionadamente grande para su tamaño y llama la atención un larguísimo y cónico pico de color negro. Vuela a escasa altura y a gran velocidad batiendo fuertemente las alas. Se alimenta principalmente de pececillos que captura lanzándose en picado, aunque también de larvas y adultos de insectos acuáticos, renacuajos, anfibios adultos, crustáceos o moluscos.

HÁBITAT

Especie relativamente poco exigente a la hora de establecerse, aunque precisa cierta calidad de las aguas, vegetación palustre más o menos densa, posaderos apropiados, pesca abundante y taludes arenosos para anidar.



O: Coraciformes. F: Alcedinidae.  

E F M A M J J A S O N D



O: Passeriformes. F: Paridae.  

E F M A M J J A S O N D

DESCRIPCIÓN

Pequeño pajarillo (L: 11,5 cm, E: 17-20 cm) de apariencia inconfundible, gracias sobre todo a su característica cresta triangular y apuntada, de plumas blancas y negras y que despliega habitualmente. Su cara es también un juego de bandas negras y blancas: presenta una conspicua corbata negra que se prolonga a modo de collar; además tiene una línea ocular negra, y otra que recorre la mejilla, siempre sobre fondo claro o blanco. Se alimenta tanto de semillas (piñones y frutos de enebros) como de arañas e insectos, siendo estos últimos los que integran la parte más importante de su alimentación.

HÁBITAT

Es un ave forestal que habita en diversos tipos de bosque, preferentemente pinares, pero también abunda en formaciones de alcornoque, roble melojo, encina, sabina albar, etc.

DESCRIPCIÓN

Algo menor que el milano real (L: 55-60 cm, E: 130-155 cm), coloración general más oscura y cola menos ahorquillada. Las partes inferiores se muestran algo rojizas y surcadas por motas alargadas y las alas presentan bordes bastante claros. Cabeza grisácea y finamente listada y cola marrón-grisácea con abundante barrado. El plumaje del joven es más claro. El macho retorna de África antes que la hembra. Generalmente se reúnen en grupos para criar y construyen sus nidos en árboles. Básicamente carroñero. En su dieta se incluyen las más variadas presas, desde pequeños roedores hasta conejos, aves, anfibios, reptiles, peces y grandes insectos.

HÁBITAT

Se instala en una gran variedad de hábitats, aunque prefiere áreas cercanas a masas de agua. En época reproductora está ligado a zonas arboladas donde situar el nido.



O: Falconiformes. F: Accipitridae.  

E F M A M J J A S O N D



Milano real

Milvus milvus

DESCRIPCIÓN

Rapaz de mediano tamaño (L: 60-66 cm, E: 154-170 cm) de alas y cola largas de color marrón rojizo y cabeza clara con el iris del ojo amarillo. Su silueta es muy característica debido a sus estrechas alas y, sobre todo, a su larga cola fuertemente ahorquillada. Disponen sus nidos en árboles. Esencialmente se alimenta de carroñas de mamíferos y aves. Además puede capturar roedores, conejos, aves jóvenes, lombrices y grandes insectos. Población local sedentaria. En invierno llegan numerosas aves del centro y norte de Europa que se reúnen en dormideros en árboles.

HÁBITAT

En época de cría prefiere zonas abiertas y arboladas, evitando llanuras desarboladas y zonas abruptas. En invierno ocupa áreas más abiertas.

O: Falconiformes. F: Accipitridae.  

E F M A M J J A S O N D

Oropéndola

Oriolus oriolus

DESCRIPCIÓN

Ave de tamaño similar a un mirlo (L: 24 cm, E: 45 cm) y aspecto inconfundible por su vivo plumaje amarillo que contrasta con las alas y la cola de color negro. En las alas presenta una franja amarilla y, entre el ojo y el pico, una mancha negra. Las hembras poseen un aspecto más discreto con tonos más verdosos. Se alimenta principalmente de invertebrados (orugas, escarabajos, abejas, saltamontes). En verano la fruta forma una parte muy importante de su dieta.

HÁBITAT

Ocupa valles y sotos fluviales bien desarrollados. Presenta un marcado carácter arborícola, necesitando de grandes árboles para vivir.



O: Passeriformes. F: Oriolidae.  

E F M A M J J A S O N D

Mochuelo

Athene noctua

DESCRIPCIÓN

Ave de pequeño tamaño (L: 21-23 cm, E: 51-54 cm), aspecto rechoncho y sin las 'orejas' características de otras rapaces nocturnas. Plumaje marrón-grisáceo con un tupido moteado blanco, siendo la parte ventral más clara. Cabeza con finas manchas blancas y cejas blancas que enmarcan unos grandes ojos amarillos. Cola y alas cortas, redondeadas y con franjas parduzcas. Su vuelo es rápido y ondulado y son característicos sus movimientos al alarmarse, encogiéndose y estirando la cabeza. Caza sobre todo al crepúsculo y al alba. La dieta se basa principalmente en invertebrados, pero también caza pequeños micromamíferos como ratones de campo, anfibios, reptiles o pájaros.

HÁBITAT

Prefiere espacios abiertos como zonas agrícolas, olivares, dehesas, o pastizales con árboles o edificios dispersos. Cría en oquedades.

O: Strigiformes. F: Strigidae.  

E F M A M J J A S O N D

Paloma torcaz

Columba palumbus

DESCRIPCIÓN

Es la mayor y corpulenta de las palomas europeas (L: 40-42 cm, 75-80 cm). Su plumaje es de color gris pizarroso, con tonos parduscos en dorso y alas, y rosados en el pecho. Fácilmente identificable por presentar una gran mancha blanca en cuello, rodeada de reflejos verdes y púrpuras. En vuelo destacan las franjas blancas en forma de media luna de sus alas. Cola gris con una ancha franja terminal negra. Se alimenta fundamentalmente de semillas y plantas cultivadas. Los pollos se alimentan con una secreción del buche llamada "leche del pichón", que recogen introduciendo sus picos en la garganta de los adultos.



O: Columbiformes. F: Columbidae.

E F M A M J J A S O N D

HÁBITAT

Ocupa una gran variedad de ambientes (forestales, agrícolas, urbanos), aunque prefiere encinares y alcornoques. En invierno, las bandadas de torcazes se componen de centenares e incluso millares de aves.



O: Passeriformes. F: Turdidae.  

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN

Ave más pequeña que un gorrión (L: 14-16 cm, E: 20-22 cm) y aspecto rechoncho. Destaca en su plumaje una gran mancha pectoral de color anaranjado. Posee una franja azul grisácea por flancos y lados de la cabeza. Dorso y alas de color pardo, y vientre blanco sucio. Se alimenta principalmente de insectos (hormigas, arañas, escarabajos, etc.) pero en otoño completa su dieta con semillas y frutos.

HÁBITAT

Ave ligada a bosques (encinares, alcornocales y riberas) con buena representación de sotobosque.

DESCRIPCIÓN

Ave del tamaño de un gorrión (L: 14-16 cm, E: 24-28 cm). Presenta claro dimorfismo sexual. Macho con cabeza y cuello de color gris azulado y frente negra. Dorso pardo rojizo. Mejillas, garganta y resto de las partes inferiores pardo rosadas. En vuelo, destacan dos franjas blancas en las alas y en la parte externa de la cola. Hembra más discreta, con plumaje más apagado. Se alimenta principalmente de granos y semillas silvestres, aunque también incorpora a su dieta pequeños insectos, sobre todo en primavera.

HÁBITAT

Aparece en zonas arboladas, ya sean cerradas o abiertas. De forma secundaria también ocupa parques, jardines, huertos y cultivos, siempre que exista arbolado.



O: Passeriformes. F: Fringillidae.  

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---



O: Piciformes. F: Picidae.  

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN

El menor de los pájaros carpinteros extremeños (L: 14-16 cm, E: 24-29 cm) se caracteriza por cuerpo rechoncho y corto, cabeza redondeada y pico relativamente corto. Dorso y alas negras, con barreado blanco. Partes inferiores blanquecinas con manchas oscuras en el vientre. En el macho destaca mancha de color rojo entre la frente y la nuca. Con su pico construye el nido perforando los troncos y ramas de los árboles. Se alimenta de insectos de la madera (xilófago), especialmente de escarabajos.

HÁBITAT

Especie forestal, habita bosques caducifolios densos y adeshados.

DESCRIPCIÓN

De figura parecida a la de una urraca pequeña (L: 34-35 cm, E: 38-40 cm) es fácilmente identificable por la belleza de su plumaje, con alas y cola de color azul. Cabeza con capirote negro brillante. Partes superiores e inferiores pardo-rosadas y garganta blanca. Es una especie muy gregaria que vive todo el año formando grupos más o menos numerosos. Se alimenta principalmente de insectos, aunque a finales del verano y durante el otoño añade frutos a su dieta.

HÁBITAT

Especie ligada a bosques aclarados, dehesas, pinares, frutales, olivares y riberas, siendo escaso en las masas forestales más densas.



O: Passeriformes. F: Corvidae.  

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN

Ave de pequeño tamaño (L: 21-23 cm, E: 33-37 cm). El macho posee un plumaje azul oscuro muy característico. El plumaje de la hembra es de coloración gris o gris-parda, y, en las partes inferiores, presenta un suave jaspeado con motas blancas. Se pueden confundir con los mirlos, pero estos son más grandes y corpulentos, y los roqueros mucho más estilizados y colilargos. A lo largo de todo el año consume toda clase de



invertebrados. En verano incorpora a su dieta pequeños reptiles, y en otoño e invierno completa su alimentación con frutos carnosos.

HÁBITAT

Ocupa parajes soleados, secos, cálidos y con abundancia de roquedos, como cañones fluviales, cumbres de media montaña, acantilados, etc.

O: Passeriformes. F: Turdidae.  

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN

Ave acuática del tamaño de un ánade grande (L: 46-51 cm, E: 85-90 cm), elegante, de cuello estilizado, pico largo y apuntado, y cuerpo alargado. En verano luce un plumaje vistoso, con la parte superior de la cabeza negra, en la que destacan dos grupos de plumas a modo de penachos. Los peces que captura mientras bucea constituyen el principal componente de su dieta. De forma ocasional puede consumir también invertebrados como insectos y sus larvas.

HÁBITAT

Ocupa una amplia variedad de zonas húmedas, tanto del interior como litorales, siempre que sean de aguas abiertas, medianamente profundas y con presencia de peces.



O: Podicipediformes. F: Podicipedidae.  

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN

Ave parecida a la avutarda pero de menor tamaño (L: 40-45 cm, E: 110-115 cm), de color pardo amarillento con barreado negro en las partes superiores y vientre blanco. El macho es mayor que la hembra, y presenta un característico collar negro, especialmente en la época nupcial. En vuelo, alas blancas con la punta de las primarias negras. Especie fundamentalmente herbívora, aunque también consume artrópodos.

HÁBITAT

Ocupa hábitats abiertos o con arbolado disperso, dominados por cultivos cerealistas de secano o pastizales extensivos.

O: Gruiformes. F: Otidae.  

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---



DESCRIPCIÓN

Ave ligeramente mayor que un gorrión (L: 12-14 cm, E: 22-27 cm) fácilmente identificable por su color gris azulado y por "carecer de cuello". Cabeza con lista ocular negra que se extiende hasta la nuca. Pecho y abdomen anaranjado. Pico gris oscuro, fuerte y delgado. Destaca también por sus movimientos pegado a los troncos, a veces cabeza abajo, en busca de los invertebrados que constituyen su dieta. También se alimenta de frutos y semillas.

HÁBITAT

Especie ligada a masas arboladas naturales y maduras, decantándose por robledales y alcornocales.

O: Passeriformes. F: Sittidae.  

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---



Lepidópteros



Insectos con las alas cubiertas de diminutas escamas de colores. En su ciclo vital sufren metamorfosis, pasando por las fases de: "huevo" que pone una mariposa adulta; "larva u oruga", nacida del huevo; "crisálida", donde la oruga sufre una transformación dentro de un capullo sedoso y finalmente, "mariposa o adulto" resultante de dicha transformación.

Mariposa del madroño. *Charaxes jasius*

O: Lepidoptera. F: Nymphalidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

E alar: 65-90 mm. Parte interior de las alas con franjas negras, naranjas y amarillas y en la exterior, se alternan blancos, negros, naranjas y marrones. Alas posteriores con ocelos. Oruga verde con línea lateral amarilla y cuatro "cuernos" en la cabeza. Se alimentan de hojas del madroño.



Mariposa limonera. *Gonepteryx rhamni*

O: Lepidoptera. F: Pieridae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

E alar: 48-54 mm. Sus alas se confunden con hojas, tienen un punto rojizo anaranjado en el centro y son de color limón en el macho y blanco-verdoso en la hembra. Planta nutricia: aladierno. Orugas verdes con los laterales más claros.

Chupaleches o podalirio. *Iphiclidides podalirius*

O: Lepidoptera. F: Papilionidae

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

E alar: 65-80 mm. Las alas delanteras son amarillentas con franjas negras verticales y las posteriores con ocelos azulados de contorno anaranjado, cuatro machas azules y larga cola. Reverso más claro. Orugas verdes que se alimenta especialmente de rosáceas.



Doncella de ondas. *Euphydryas aurinia*

O: Lepidoptera. F: Nymphalidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

E alar: 35-45 mm. Haz de las alas anaranjado con manchas amarillas y negras. Envés de las posteriores anaranjado rojizo con franjas y puntos blancos. Principal planta nutricia: madre selva. Sus orugas son negras con puntitos y franja lateral blancos.



Odonatos

Orden de insectos que incluye a las libélulas - que presentan las alas posteriores mayores que las anteriores, se posan sin juntar las alas y tienen los ojos unidos o muy próximos - y los caballitos del diablo - que tienen alas iguales entre sí, juntan éstas al posarse y presentan los ojos separados-. Se encuentran en las cercanías de charcos, ríos y embalses, ya que sus ninfas son acuáticas. Son voraces depredadores que se alimentan de mosquitos y otros pequeños insectos. En el Parque encontramos especies como:

Libellula quadrimaculata

O: Odonatos. F: Libellulidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Tamaño entre 40 y 48 mm. Con abdomen ancho y de color marrón, con una fila de manchas amarillas a cada lado. Patas negras. Presenta marcas negras a mitad de camino a lo largo del borde principal de cada ala, de ahí su nombre (quadrimaculata = "cuatro manchas"). Macho y hembra muy parecidos.



Libélula Sympetrum fonscolombii

O: Odonatos. F: Libellulidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Tamaño entre 33 y 40 mm, con coloración roja intensa en los machos maduros. Ojos rojos en la parte delantero-superior y gris-azulados en la postero-inferior. Cara amarilla y patas negras con líneas longitudinales amarillas. Las hembras y los inmaduros son de color amarillo con líneas negras.



Caballito del diablo Coenagrion scitulum

O: Odonatos. F: Coenagrionidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Tamaño entre 30 y 33 mm, de intenso color azul con manchas negras en los machos. Ojos azules con parte superior negra. La coloración de la hembra va del verde-amarillo al azul.



Caballito del diablo Calopteryx haemorrhoidalis

O: Odonatos. F: Calopterygidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Tamaño entre 45 y 48 mm. Presenta ojos oscuros, y alas anchas, ovaladas y de coloración casi negra en el macho. La parte ventral de los últimos segmentos del abdomen es de color fucsia. Hembra de color verde cobrizo, con alas ligeramente rojizas y franja oscura bien delimitada.



DESCRIPCIÓN

Pequeño reptil exclusivo de la Península Ibérica, similar a una lagartija "sin patas" y de apenas 17 cm de longitud (la mitad corresponde a la cola). Patas muy cortas y poco funcionales. Cuerpo grueso y cilíndrico, con la cabeza pequeña, corta y puntiaguda, y cuello poco diferenciado. Color pardo, gris, oliva... con ocelos dispersos blanquecinos o amarillentos con borde oscuro.

Banda gruesa y oscura en cada flanco y a veces otra vertebral. Muestra gran habilidad para enterrarse rápidamente en la arena suelta y se desplaza replegando sus cortas extremidades y deslizándose su cuerpo a base de rápidos movimientos ondulatorios.

O: Squamata. F: Scincidae.  

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

HÁBITAT

Prefiere lugares arenosos con vegetación dispersa.

DESCRIPCIÓN

Es el lagarto más grande de Europa. De cuerpo muy robusto, capaz de alcanzar tallas enormes, (hasta 23 cm desde el hocico hasta la cloaca) y cola de doble longitud que el resto del cuerpo. Algunos llegan a medir hasta 70 cm de longitud total. La cabeza es grande y triangular, armada de poderosas mandíbulas. Extremidades bien desarrolladas y provistas de fuertes uñas. De color variable; el dorso, puede ser verde, amarillo o parduzco grisáceo, con escamas pequeñas y redondeadas. Usualmente presenta flancos adornados con manchas azules.

HÁBITAT

Ocupa todo tipo de hábitats mediterráneos, pudiéndose encontrar bajo condiciones muy diferentes. Por lo general, prefiere zonas de vegetación aclarada, con espacios abiertos donde poder tomar el sol y refugios para esconderse.

O: Squamata. F: Lacertidae.  

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN

Quelonio (del griego "quelon": duro) cuyo caparazón, ligeramente abombado, raramente supera los 25 cm de longitud y es mayor en las hembras que en los machos. Su parte superior es generalmente negro con rayas en disposición radial de color amarillento, aunque puede variar. Presenta manchas irregulares amarillentas, rojizas o blanquecinas en patas, cabeza y cola. La parte inferior del caparazón del macho es cóncavo, mientras que el de la hembra, convexo.

Además, la cola del macho es más larga y robusta. Activo durante el día, suele solearse en piedras grandes o troncos que sobresalen del agua. Se alimenta fundamentalmente de invertebrados y anfibios aunque también puede comer carroña y plantas.

HÁBITAT

Ocupa todo tipo de masas de agua, naturales o artificiales, con preferencia por aquellas con escasa corriente y abundante cobertura vegetal.

O: Testudines. F: Emydidae.  

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN

Lagarto de aspecto robusto y tamaño medio (13 cm de longitud entre hocico y cloaca), pudiendo ser la cola el doble de larga que el cuerpo. Cabeza corta y ancha. Presenta marcado dimorfismo sexual. Machos más esbeltos que las hembras, y con coloración muy vistosa; la mayor parte del cuerpo es verde oscuro/amarillento con puntos negros, y la cabeza azulada especialmente intensa en época de celo. Partes inferiores amarillas con moteado negro. Hembras más pequeñas y discretas.

HÁBITAT

Ocupa hábitats ligados a los cursos altos de los ríos extremeños, por ello es también conocido como lagarto de agua. Prefiere las paredes de piedras de bancalas próximos al río.

O: Squamata. F: Lacertidae.  

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---



O: Anura. F: Ranidae.  

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN

Rana parda de pequeño tamaño (puede alcanzar hasta 7cm de longitud, aunque generalmente es menor) y muy esbelta. Coloración mimética con una mancha oscura entre el ojo y el tímpano y garganta también oscura con línea central clara. Tímpano más pequeño que el ojo, poco destacado y separado de éste. Los miembros posteriores son extraordinariamente largos. Presenta tanto actividad diurna como nocturna. Captura sus presas tanto en agua como en tierra, pero predominan las presas terrestres. Tres grupos son los más abundantes en la dieta: dípteros, coleópteros y arañas.

HÁBITAT

Se encuentra en arroyos de aguas frías y rápidas, charcas y lagunas de alta montaña. Vive cerca de la orilla.

DESCRIPCIÓN

Sapillo con aspecto de rana con longitud total de hocico a cloaca inferior a 5 cm, presentando los machos menor tamaño que las hembras. El dorso es grisáceo, verdoso o pardo, salpicado de verrugas de color verde "perejil" o marrones y el vientre es de color crema claro. Tiene ojos grandes con la pupila vertical, cabeza aplastada, hocico redondeado y largas extremidades. En fundamentalmente nocturno y su mayor actividad se concentra durante la época de reproducción y en periodos de lluvia, el resto del tiempo aparece en galerías, bajo rocas,... Se alimenta de pequeños invertebrados como insectos o lombrices. Era considerado dentro de la especie *Pelodytes punctatus* (sapillo moteado común), hasta que en el año 2000 se determinó que eran especies distintas.

HÁBITAT

Ocupa espacios abiertos y, para la puesta, las hembras eligen charcas temporales, remansos de arroyos, abrevaderos, canteras abandonadas e incluso cunetas inundadas.



O: Anura. F: Pelodytidae.  

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

O: Anura. F: Ranidae.  

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---



DESCRIPCIÓN

Rana de pequeño tamaño que rara vez supera los 5cm de longitud. Cabeza más larga que ancha, con el morro redondeado. Ojos laterales con pupila horizontal. Piel del dorso lisa y reluciente, mientras que en el vientre es granulosa. Color verde claro, con una banda negra que comienza antes del ojo, continúa por el costado en zigzag y llega hasta la ingle, visible también en los miembros posteriores. El borde de esta mancha esta rodeado de blanco en el dorso.

HÁBITAT

Los adultos frecuentan prados, juncaladas, zarzales y zonas arbustivas densas cerca de charcas y ríos. Sus principales hábitats de reproducción son las charcas temporales. También en charcas permanentes, prados encharcados, regueros, arroyos de escasa corriente y humedales costeros e interiores con abundante vegetación palustre.

DESCRIPCIÓN

Anfibio con aspecto de rana de hasta 7 cm de longitud de hocico a cloaca, siendo los machos de mayor tamaño. La piel es brillante y de color variable, desde gris, pardo u oliva hasta rojizo, con manchas oscuras en el dorso y vientre claro con pintas marrones. Presenta un hocico largo y puntiagudo, lengua con forma de disco. Ojos con pupilas triangulares o acorazonadas e iris dorado en el tercio superior y oscuro en los dos inferiores. Especie activa durante el día y la noche. Su alimentación está basada en una amplia variedad de invertebrados, principalmente insectos alados.

HÁBITAT

Ocupa zonas abiertas, como claros en los límites de áreas boscosas asociadas a riberas de ríos y arroyos y prefiere aguas quietas con mucha vegetación. Los lugares de reproducción son de escasa profundidad como charcas, fuentes o pequeños riachuelos.

O: Anura. F: Discoglossidae.  

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---



DESCRIPCIÓN

Anfibio con cola que rara vez sobrepasa los 20 cm de longitud (de hocico a cola). Piel negra con manchas amarillas o anaranjadas de diseño variable y llamativo que anuncia el mal sabor e irritación de las

O: Urodela. F: Salamandridae. 

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

secreciones producidas por sus glándulas. Su piel es lisa, blanda y sin escamas, con surcos en los costados y poros glandulares a ambos lados del cuerpo. Son sedentarias y de actividad predominantemente nocturna, más activas tras las lluvias. Se reproduce cuando las condiciones de temperatura y humedad son las adecuadas. Las larvas nacen directamente de la madre, incubándose los huevos dentro de ella (ovovivípora). Son muy voraces y se alimentan casi exclusivamente por invertebrados, principalmente lombrices y pequeños insectos.

HÁBITAT

Ligada a zonas con la suficiente humedad, reproduciéndose principalmente en arroyos, pilones, albercas y charcas



Tritón ibérico

Lissotriton boscai

DESCRIPCIÓN

Anfibio con cola cuya longitud total incluida la cola está entre 6,7 y 10 cm, mayor en las hembras que en los machos. La piel es blanda y húmeda; pardusca con manchas oscuras en el dorso, y de color amarillo-anaranjado con motas negras en el vientre. Tiene una marcada banda lateral blanca entre el vientre y del dorso. Posee hocico redondeado y su cola, de longitud igual o mayor que la cabeza y el cuerpo

O: Urodela. F: Salamandridae. 

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

juntos, está aplanada lateralmente. Los adultos exhiben una postura defensiva arqueando el cuerpo y mostrando la llamativa coloración de la zona ventral. Se alimenta de larvas de insectos y otros pequeños invertebrados tanto terrestres como acuáticos.

HÁBITAT

Especie muy ligada al agua, propia de aguas estancadas de aguas limpias, pequeñas charcas, arroyos y cuevas. Cría tanto en medios permanentes como en charcas temporales. Presentan una fase acuática y otra terrestre.



Víbora hocicuda. *Vipera latastei* 

O: Squamata. F: Colubridae.

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

De hasta 75 cm de largo, cuerpo grueso y cabeza ancha y triangular, con el hocico estrecho y remangado. Dorso pardo o gris con manchas en forma de zigzag o romboidal y vientre negro. Costumbres principalmente diurnas y, como todas las serpientes, se refugian hibernando durante el periodo frío. Veneno muy irritable aunque poco peligroso para el hombre. Se encuentra en áreas secas con abundantes rocas o pedregales.



Culebra bastarda. *Malpolon monspessulanus* 

O: Squamata. F: Colubridae.

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

Es la mayor de las culebras de la Península (hasta 2,5 m de longitud). Ojos grandes y escamas a modo de "ceja". Dorso oliváceo gris o parduzco claro y partes inferiores amarillentas con ligero moteado oscuro. Muy activa durante el día. Es muy ágil y paraliza a sus presas con veneno. Ocupa hábitats desde dehesas, matorral mediterráneo o llanuras.



Culebra de collar. *Natrix natrix* 

O: Squamata. F: Colubridae.

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

No suele sobrepasar 1,2 m. Coloración entre verde oliva, gris o pardo con pequeñas áreas oscuras. Suele presentar una mancha oscura tras la cabeza bordeada de amarillento ("collar"). Cabeza grande con hocico ancho y romo. Buena nadadora. Muy ligada a puntos de agua y ambientes frescos.



Culebra de herradura. *Hemorrhois hippocrepis* 

O: Squamata. F: Colubridae.

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

Alcanza 1,5 m de longitud. Dorso de coloración blanquecina, amarillenta o verdosa con manchas oscuras. El vientre es rojizo, anaranjado o blanquecino-amarillento. Cabeza pequeña y ancha con forma de U o de herradura en su parte superior. Actividad generalmente diurna. Muy ágil, trepa bien. Prefiere áreas secas con fuerte insolación.



Ciervo común

Cervus elaphus

DESCRIPCIÓN

Es el mayor de los cérvidos españoles. Su pelaje es pardo rojizo en verano y algo más grisáceo en invierno, sin motas en los adultos. La especie muestra un gran dimorfismo sexual, los machos son más grandes y poseen una cornamenta ósea que renuevan cada año. Estos cuernos son ramificados y se caen entre marzo y abril. El ciervo está adaptado a una alimentación mixta de hierba y especies arbustivas y arbóreas.

HÁBITAT

Aunque es originario de zonas abiertas, actualmente el hábitat ideal es el formado por zonas forestales alternadas con praderas.



O: Artiodactyla. F: Cervidae.

E F M A M J J A S O N D

Gato montés

Felis silvestris

DESCRIPCIÓN

Semejante a un gato doméstico, aunque de tamaño mayor (100 cm de longitud total) y aspecto más robusto y corpulento, con patas relativamente cortas y cabeza ancha. Destacan los bigotes densos y de apariencia caída. Orejas pequeñas y distanciadas entre sí, a veces plegadas sobre la cabeza. Rostro relativamente plano, el hocico, corto de color carne. Pelaje en general pardo-grisáceo, con diversas rayas negras distribuidas por cabeza, cuello y extremidades. Una notable línea dorsal negra recorre la columna vertebral acabando antes del comienzo de la cola. Esta última es larga y ancha, acabada en una borla redonda y negra, y puede presentar de tres a cinco anillos negros, más o menos marcados. Vespertino y nocturno, se alimenta fundamentalmente de micromamíferos y aves.

HÁBITAT

Habita el bosque mediterráneo en mosaico con matorral y cultivos de secano.



O: Carnívora. F: Felidae. IE IE

E F M A M J J A S O N D

Garduña

Martes foina

O: Carnívora. F: Mustelidae. IE

E F M A M J J A S O N D

DESCRIPCIÓN

Carnívoro de tamaño medio (40-55 cm de longitud) y cuerpo esbelto y alargado. Destaca un característico babero de color blanco desde la garganta hasta las patas y parte del vientre, que contrasta con el resto del cuerpo de color pardo. Cabeza grande y alargada, más clara que el cuerpo, con orejas redondeadas, ojos grandes y hocico alargado. Patas cortas provistas de 5 dedos. Cola larga (20-28 cm) y oscura, que usa como balancín para guardar el equilibrio cuando se mueve entre los árboles. Muy parecida a la marta, se diferencia de ésta por el color del babero, siendo de color ocre o anaranjado en la marta.

HÁBITAT

Ocupa gran variedad de hábitats (bosques, zonas agrícolas, áreas moderadamente humanizadas).



Gineta

Genetta genetta

DESCRIPCIÓN

Carnívoro de medio tamaño (50-60 cm de longitud) con cuerpo alargado de coloración amarillenta-grisácea salpicado de manchas oscuras. Cola gruesa y larga (de longitud superior a la del cuerpo) con machas anilladas de color negro. Cabeza pequeña y alargada, con orejas grandes, erectas y redondeadas. Grandes ojos pardos sobre manchas blancas que contrastan con una franja oscura que rodea la base del hocico. Patas anteriores cortas en contraste con las traseras, más largas y musculadas, que facilitan los hábitos trepadores del animal. Cinco dedos en pies y en manos (generalmente sólo marca cuatro en las huellas) y uñas semirretráctiles. Es un animal activo durante la noche, ágil cazador de lagartos, insectos, pequeñas aves y mamíferos. En otoño, los frutos juegan un importante papel en su dieta.

HÁBITAT

Ocupa zonas boscosas, aunque se adaptan con facilidad a todo tipo de medios.

O: Carnívora. F: Viverridae. IE

E F M A M J J A S O N D





O: Artiodactyla. F: Suidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN

Mamífero de mediano tamaño (120 cm de longitud del cuerpo y 22 cm de la cola). Es el antepasado del cerdo doméstico, al que se parece por su cuerpo rechoncho, cuello corto y patas cortas y delgadas y cola terminada en un mechón de pelos negros. Está revestido de pelos duros denominados "cerdas", de color pardo sucio. Las crías se denominan rayones por tener en el costado rayas más claras. Se desplaza en grupos matriarcales, normalmente de tres a cinco animales formados por hembras y sus crías. Son omnívoros y comen gran variedad de alimentos, tanto vegetales como animales.

HÁBITAT

Se adapta a todo tipo de hábitats siempre que disponga de una mínima cobertura y alimento, aunque prefiere los lugares con una vegetación donde pueda camuflarse y abunde el agua para beber y donde poder revolcarse.

DESCRIPCIÓN

Mamífero de 64-67 cm de longitud de cuerpo y 39 a 42 cm de cola, con el cuerpo alargado, patas cortas, pies palmados y pelaje denso e impermeable adaptado a la vida semiacuática. Cola larga y ancha en la base. Color general pardo, partes inferiores grisáceas y garganta más clara. Peso aproximado de 11 Kg. Muy territorial y de actividad básicamente crepuscular y nocturna. Dejan abundantes rastros de su presencia. Alimentación a base de peces, crustáceos (cangrejos), anfibios, mamíferos, reptiles e insectos.

HÁBITAT

Propia de ecosistemas acuáticos, aunque puede verse lejos del agua cuando se desplaza entre dos masas de agua.

O: Carnívora. F: Mustelidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---



Son los únicos mamíferos capaces de volar, presentan actividad nocturna y sus alas son amplias expansiones de piel sustentadas por sus patas y dedos. Poseen un sofisticado sistema de vuelo y localización por ultrasonidos. En el Parque podemos encontrar 14 especies de murciélagos, destacando las siguientes:

Murciélago grande de herradura

Rhinolophus ferrumequinum

O: Chiroptera. F: Rhinolophidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Gran tamaño (20 g) y coloración entre castaño grisáceo y rojizo, con la región ventral más pálida. Presentan unas estructuras membranosas con forma de herradura en torno a la nariz. Dieta constituida principalmente por insectos como polillas y escarabajos. Vive en diversos paisajes siempre que dispongan de cierta cobertura arbórea o arbustiva.



Murciélago mediano de herradura

Rhinolophus mehelyi

O: Chiroptera. F: Rhinolophidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Tamaño mediano (15 g). Suele mostrar pelaje anaranjado, partes inferiores blancas y muchos presentan el pelaje más oscuro alrededor de los ojos a modo de antifaz. Poseen unas estructuras membranosas en torno a la nariz cuya forma recuerda a una herradura. Típico de las regiones mediterráneas, con abundante matorral y bosque de encinas o alcornoques.



Murciélago de cueva

Miniopterus schreibersii

O: Chiroptera. F: Rhinolophidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Tamaño mediano (9-16 g) de color pardo grisáceo. Cabeza con hocico muy corto, de aspecto achatado, y orejas triangulares y muy pequeñas. Se alimenta de insectos que captura en espacios abiertos. Vive en gran variedad de medios siempre que cuenten con refugios.



DESCRIPCIÓN

Mamífero de mediano tamaño (entre 65 y 100 cm de longitud total). De constitución potente, cuerpo robusto y patas cortas y fuertes provistas cada una de 5 dedos con largas uñas que le sirven para excavar.

Cabeza pequeña, alargada y triangular, de color blanca, con dos franjas negras laterales que abarcan los ojos, muy características de la especie. Hocico prominente, móvil y musculoso que emplea para hozar. Cuello corto, como la cola. Piel gruesa y resistente, cubierta de denso pelaje grisáceo. Partes inferiores y patas más oscuras. Come prácticamente de todo (omnívoro). Tiene hábitos nocturnos, con los sentidos del olfato y el oído muy desarrollados.

HÁBITAT

Ocupa todo tipo de hábitats, aunque prefiere las áreas de mosaico bosque-pastizal.

O: Carnívora. F: Mustelidae. 

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

**Topillo de Cabrera***Iberomys cabreræ***DESCRIPCIÓN**

Topillo de gran robustez (40 y 80 g). La cabeza junto con el cuerpo mide entre 11 y 13 cm de longitud y la cola entre 3 y 4,5 cm. Presenta un pelaje espeso pardo o grisáceo en el dorso y color crema en el vientre. Tiene la cabeza grande, el cuello corto, los ojos pequeños, las orejas casi ocultas y la cola con poco pelo y más oscura por encima. Son básicamente nocturnos, pero con actividad diurna. Dejan rastros como restos de plantas roídas por el animal, galerías superficiales sobre el suelo, o sus excrementos negros, cilíndricos y de extremos romos. Su dieta es estrictamente herbívora, requiriendo alimento verde todo el año. Se basa principalmente en gramíneas, en menor medida juncos y ocasionalmente consumen insectos.

HÁBITAT

Ocupa zonas húmedas del ámbito mediterráneo.

O: Rodentia. F: Muridae.  

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---



Peces de tamaño considerable que poseen la boca situada en la zona interior y cuatro barbillones sensitivos cortos. Alimentación basada en insectos y materia vegetal. Los machos suelen ser menores que las hembras y presentan tubérculos en la cabeza durante la época de freza. En el Parque se encuentran dos especies de barbos:

Barbo comizo. *Barbus comiza*


Barbo de mayor tamaño. Posee un alargamiento en la cabeza de los adultos, especialmente en el hocico, y el último radio de la aleta dorsal fuertemente aserrado. Prefiere tramos bajos de los ríos, zonas profundas y con poca corriente, adaptándose bien a los embalses.

Barbo común. *Barbus bocagei*

Presenta último radio de la aleta dorsal denticulado en los adultos solamente en la parte inferior del mismo. Aparece tanto en ríos de corriente lenta como en embalses, aunque en la época de freza puede remontar hasta zonas bajas de gargantas.

O: Cypriniformes. F: Cyprinidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

**Boga del Tajo***Pseudochondrostoma polylepis***DESCRIPCIÓN**

Ciprinido de considerable tamaño que llega a sobrepasar los 30 cm de longitud total. Cuerpo sumamente alargado, con un pedúnculo caudal corto y estrecho. La cabeza es larga, con un morro prominente y la boca en ínfera. De coloración plateada, las aletas presentan un buen desarrollo, especialmente la dorsal y la anal.

La alimentación está constituida mayoritariamente por algas.

HÁBITAT

Se adapta bien a las diferentes condiciones, faltando solamente en los ríos muy fríos y rápidos. En los embalses es frecuente, aunque sus poblaciones están bastante envejecidas.

O: Cypriniformes. F: Cyprinidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---



DESCRIPCIÓN

Pez de tamaño medio (10-20 cm). También se le denomina cachuelo o bordallo. Presenta un color plateado, algo oscurecido en el dorso y más claro hacia el vientre. Tiene escamas grandes, con un borde oscuro en la base muy característico. Baza su alimentación en pequeños crustáceos, complementado con materia vegetal principalmente en verano, cuando la disponibilidad de presas disminuye. La hembra

O: Cypriniformes. F: Cyprinidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

normalmente realiza dos puestas en zonas poco profundas sobre fondo de grava y piedras. Esta especie puede hibridar con el calandino.

HÁBITAT

Especie propia de los tramos medios de los ríos, pero puede vivir en ambientes sumamente variados.

**Calandino***Squalius alburnoides***DESCRIPCIÓN**

Especie de pequeño tamaño que raramente sobrepasa los 10 cm de longitud. Cabeza pequeña con respecto al cuerpo y boca en posición bastante superior. El cuerpo presenta un pedúnculo caudal largo y estrecho. La aleta anal es larga, con un perfil recto o cóncavo, carácter


éste que lo diferencia de los jóvenes cachos. A lo largo de todo el flanco del animal es notable una banda oscura. Se alimenta de insectos acuáticos superficiales.

HÁBITAT

Vive tanto en ríos de corriente lenta con vegetación como en ríos de montaña con aguas frías y rápidas, aunque desaparece en aquellos tramos que, por su excesiva rapidez y altitud sólo vive la trucha.

O: Cypriniformes. F: Cyprinidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

**DESCRIPCIÓN**

Pez de pequeño tamaño que no suele ser mayor de 15 cm de longitud, siendo los machos más pequeños que las hembras. Tiene el cuerpo alargado, con manchas oscuras, que en los machos suelen formar líneas bien definidas. Poseen una pequeña espina debajo cada ojo que les sirve para defenderse de los depredadores desplegándose en caso de peligro. Presentan seis barbillones bucales cortos. Se alimenta principalmente de larvas de insectos, pequeños crustáceos, algas y materia en descomposición.

HÁBITAT

Especie propia de zonas medias y bajas de los ríos. Le gusta estar en zonas poco profundas y que presenten gravas o gravilla en el lecho, pasando el día inmóvil oculto en el limo o entre la vegetación, siendo activo durante el crepúsculo y la noche.

O: Cypriniformes. F: Cobitidae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

**Pardilla***Iberochondrostoma lemmingii***DESCRIPCIÓN**

Pez pequeño (menos de 15 cm de longitud), con escamas muy pequeñas que lo hacen suave al tacto. Coloración oscura, a menudo con manchas negras repartidas por el cuerpo, adquiriendo un color pardo que le da nombre. El labio superior similar al de la boga, aunque algo menos prominente. Es poco ágil y mal nadador por lo que prefiere desplazarse cerca del fondo. Omnívoro, se alimenta mayoritariamente de algas, zooplankton y materia en descomposición.

HÁBITAT

Vive en ríos con aguas lentas y remansadas, con vegetación sumergida abundante, refugiándose durante el verano en las pozas que quedan en el río. Puede completar su ciclo en charcas sin remonte, conviviendo con la tenca.

O: Cypriniformes. F: Cyprinidae.


E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---



Guía

de las
principales especies de

flora



Acebuche

Olea europaea var. *sylvestris*

DESCRIPCIÓN

Variedad silvestre del olivo que se diferencia de éste por su menor tamaño (hasta 10 m de altura) y porte generalmente arbustivo. Tronco corto, irregular, grueso, que se va retorciendo según va envejeciendo. Corteza lisa, de color gris ceniciento que oscurece con el tiempo. Hojas más pequeñas y cortas que las de los olivos, de color verde grisáceo por el haz y casi blancas por el envés y agrupadas en parejas sobre los tallos. Florece entre abril y mayo, con flores blancas en racimos. El fruto (acebuchina) madura en otoño, es de menor tamaño que el del olivo y apreciado por las aves. Especie termófila, resiste la sequedad y el calor, pero es sensible a heladas frecuentes e intensas.



HÁBITAT

Aparece en todo tipo de suelos acompañando a encinas, quejigos y alcornoques, o en los matorrales que resultan de su degradación.

O: Lamiales. F: Oleaceae.

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

Aladierno

Rhamnus alaternus

DESCRIPCIÓN

Arbusto o arbolito siempreverde que puede llegar a alcanzar una altura de entre 1 y 5 m, y silueta y porte muy variable. Se caracteriza por una corteza grisácea que se agrieta en los ejemplares añosos. Tiene las hojas pequeñas, brillantes y de color verde oscuro, y generalmente con pequeños dientes en el margen. Las flores, que aparecen formando racimos, son pequeñas y muy poco llamativas, de color amarillo-verdoso. Sus frutos globulosos poseen tres huesos en su interior y son de color rojo al principio, tornándose negros en la madurez (a final del verano o en otoño). Su nombre parece derivar del celta "ram": ramaje por su elevada ramificación y el término "alaternus" significa árbol estéril. Poseen diversas propiedades medicinales: la corteza es purgante, las hojas y ramas son astringentes y se han usado contra inflamaciones.



O: Rhamnales. F: Rhamnaceae.

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

HÁBITAT

Aparece en todo tipo de terreno, formando parte de matorrales en zonas con cierta humedad y umbría, como acompañantes fundamentalmente de alcornoques y encinas.

Alcornoque

Quercus suber

DESCRIPCIÓN

Árbol perenne de tamaño medio, rara vez supera los 15 ó 20 m de altura. Muchos individuos desarrollan porte arbustivo (chaparros). Tronco grueso de color pardo-gris, agrietado, y ramas abiertas, conformando copas redondeadas. Hojas muy duras y coriáceas (que evitan la excesiva transpiración de la planta), de pequeño tamaño. Estas hojas son pinchudas en plantas jóvenes y sólo en las ramas más bajas de las adultas. A diferencia de la coscoja, el envés de las hojas está cubierto de pelos (más blanquecino). Florece en abril o mayo. Flores masculinas amarillentas agrupadas en inflorescencias colgantes (amentos). Su fruto (bellota) madura en otoño.

HÁBITAT

Característico del bosque mediterráneo. Se distribuye por diferentes tipos de suelo y ambientes climáticos, soportando bien la sequía estival.

O: Fagales. F: Fagaceae.

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

Aliso

Alnus glutinosa

DESCRIPCIÓN

Árbol de media altura (20-30 m), caducifolio. Tronco corto y rollizo con corteza lisa verde grisácea que con los años se resquebraja y oscurece. Ramas dispuestas en vertical en la zona inferior y de forma horizontal en la superior. Se caracteriza por sus hojas alternas y redondeadas de 6 a 12 cm de largo, con peciolos cortos, de color verde oscuro por el haz y algo más claro por el envés y que permanecen verdes hasta su caída. Sus raíces están muy extendidas en superficie y necesitan estar permanentemente embebidas en agua.

HÁBITAT

Se encuentra en las riberas de masas de aguas como río, arroyos, lagos y embalses de nivel constante de sus aguas.

O: Fagales. F: Betulaceae.

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

Almez

Celtis australis

DESCRIPCIÓN

Árbol caducifolio (de hasta 25 m de altura), fácil de reconocer en invierno, sin hojas, por su copa globosa con ramillería abundante y fina; en primavera, sus hojas verde amarillentas le hacen destacar entre encinas, mientras que en otoño, sus hojas amarillas le delatan a grandes distancias. Tronco recto y erguido con corteza blanquecina y lisa, poco agrietada. Hojas grandes y lanceoladas con el borde aserrado, de color verde oscuro, más claras en el envés debido a la presencia de pelos. Florece entre marzo y abril, con flores poco visibles de color amarillo verdoso. El fruto (almecina) es una drupa carnosa y redonda, de color negro-violáceo en la madurez y comestible.

HÁBITAT

Habita en barrancos y en las riberas de ríos y arroyos. Aparece generalmente aislado sobre suelos sueltos y frescos, incluso pedregosos.

O: Rosales. F: Ulmaceae.

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

Arce de Montpellier

Acer monspessulanum

DESCRIPCIÓN

Arbusto de hoja caduca que raramente supera los 10 m con densa copa y corteza gris y agrietada. Sus hojas son pequeñas, verde brillante en el haz, generalmente con tres lóbulos enteros de hasta 5 cm de largo, y que se cubren de rojo en otoño. Sus flores son verde-amarillentas, dispuestas en inflorescencias en un principio levantadas, luego colgantes. El fruto, que madura a partir de julio o agosto, se separa en dos largamente alados para facilitar su dispersión. Su nombre ("monspessulanum" = "de Montpellier"), se debe a la ciudad francesa donde fue descrito por primera vez. Se utiliza como planta ornamental, sus hojas son usadas como forraje para el ganado y su madera es muy valorada.

HÁBITAT

Se cría en zonas secas, espesuras y lugares rocosos, apareciendo de forma esporádica en el territorio.



O: Sapindales. F: Aceraceae.

E	F	M	A	My	J	Jl	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---



Brezo blanco

Erica arborea

DESCRIPCIÓN

Arbusto perennifolio que no suele alcanzar más de 4 m, de tronco y ramas tortuosas cubiertas de pelos. Sus hojas son estrechas y lineales, de tamaño reducido (como agujas), agrupadas de tres en tres y con los márgenes enrollados hacia fuera. Las flores se desarrollan al principio de la primavera, dispuestas en grupos al final de las ramas y son de un color crema verdoso y pueden ser tan abundantes que dan esta coloración a la planta o incluso al matorral. Frutos secos de tipo cápsula que se abren por 4 valvas.

Su madera, parecida a la del madroño, es buen combustible y usada para la elaboración de carbón, también se utiliza para torrear pipas. "Erica" se cree derivado del griego "ereikein": quebrar, por la fragilidad de sus ramas.

HÁBITAT

Aparece en suelos ácidos de bosques aclarados y matorrales frescos y umbrosos.

O: Ericales. F: Ericaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Brezo portugués

Erica lusitanica

DESCRIPCIÓN

Arbusto perenne y muy ramificado que alcanza los 3-4 m. de altura. Las hojas son verde claro y se disponen en grupos. Las flores son blancas con un cierto matiz rosado y se encuentran en racimos densos y alargados, dirigidos hacia el extremo de las ramas. Cuando florece, destaca con una nebulosa blanca sobre el resto de arbustos. Se diferencia del brezo blanco por sus hojas un poco más largas y también por los pelillos de las ramas sencillos y no erizado-espinosos como en la otra especie.

HÁBITAT

Se encuentra presente en matorrales desarrollados sobre suelos algo húmedos y frescos.



O: Ericales. F: Ericaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Cornicabra

Pistacia terebinthus

DESCRIPCIÓN

Arbusto o pequeño arbolillo de hasta 5 m de altura. Se diferencia del lentisco en que la cornicabra pierde las hojas en invierno y tiene un número impar de folíolos en las hojas. Hojas de color verde vivo, coriáceas, de 10 cm o más de longitud y con 3-9 folíolos. Las flores van del púrpura al verde, su fruto es del tamaño de un guisante y vira del rojo vivo al marrón, dependiendo del grado de maduración. Toda la planta emite un fuerte olor resinoso. En el periodo vegetativo se desarrollan "agallas" en forma de cuerno de cabra que se producen en las hojas tras la picadura de algunos insectos.

HÁBITAT

En los matorrales, encinares aclarados y en robledales de melojo, frecuente en laderas pedregosas.



O: Sapindales. F: Anacardiaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Coscoja

Quercus coccifera

DESCRIPCIÓN

Arbusto o pequeño arbolito (no suele superar 3 m de altura) siempreverde de corteza lisa, cenicienta y ramaje muy enmarañado. De color verde claro brillante similar al del aladierno con el que es posible confundirla en la distancia. Sus hojas pinchudas y muy duras, del tipo de la encina, evitan la confusión. Se diferencia de las matas de encina, por su color más claro y la ausencia de pelillos en la cara inferior de la hoja. Florece entre abril y mayo, con flores poco vistosas agrupadas en amentos. Los frutos (bellotas), pinchudas, de menor tamaño y menos alargadas que las de la encina, maduran en septiembre-octubre del año siguiente, siendo malas para comer por su sabor amargo.

HÁBITAT

Aparece en diferentes tipos de suelos sobre laderas secas y soleadas, soportando bien las sequías estivales.



O: Fagales. F: Fagaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---



O: Dipsacales. F: Caprifoliaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN

Arbusto muy ramoso de hasta 4 m con ramillas rojizas y follaje muy denso. Sus hojas recuerdan al laurel, son duras, de forma ova-da o lanceolada de color verde intenso, más oscuro por arriba. Flores blancas agrupadas en inflorescencias en forma de paraguas, muy vistosas y abundantes. Fruto en forma de drupa ovoide presenta un hueso en su interior y es de un bello color azul metálico que se mantienen largo tiempo en la planta. Los frutos son tóxicos e irritantes, pero se han usado en medicina. Las hojas se han utilizado para combatir la fiebre. También es planta que se utiliza como ornamental, a menudo para setos.

HÁBITAT

Aparece en zonas frescas y umbrosas en encinares, alcornoques y madroñales.



DESCRIPCIÓN

Arbusto perennifolio, puede alcanzar los 10 m de altura y posee una copa muy tupida de forma cónica, acabando frecuentemente en forma puntiaguda. Tronco grueso y derecho, de corteza fibrosa, pardo grisácea, con hojas verticiladas por tres, acicu-lares, rígidas, punzantes, con dos líneas blancas por el haz, separadas por una verdosa más estrecha. Especie dioica (pie de macho y hembra separados). Semillas cubiertas por falsos frutos carnosos (gálbulos) rojos oscuros en la madurez. Muy utilizada desde la antigüedad por el hombre que usaba la "miera" (obtenida por destilación de su madera) como antiséptico para el ganado, la madera en ebanistería y construcción y por último, sus bayas como remedios frente a dolencias digestivas y circulatorias.

HÁBITAT

Todo tipo de terrenos, en encinares y demás bosques esclerófilos mediterráneos.

O: Pinales. F: Cupressaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---



O: Fagales. F: Fagaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN

Árbol perenne de tamaño medio, rara vez supera los 15 ó 20 m de altura. Muchos individuos desarrollan porte arbustivo (chapparros). Tronco grueso de color pardo-gris, agrietado, y ramas abiertas, conformando copas redondeadas. Hojas muy duras y coriáceas (que evitan la excesiva transpiración de la planta), de pequeño tamaño. Estas hojas son pinchudas en plantas jóvenes y sólo en las ramas más bajas de las adultas. A diferencia de la cos-coja, el envés de las hojas está cubierto de pelos (más blanquecino). Florece en abril o mayo. Flores masculinas amarillentas agrupadas en inflorescencias colgantes (amentos). Su fruto (bellota) madura en otoño.

HÁBITAT

Característico del bosque mediterráneo. Se distribuye por diferentes tipos de suelo y ambientes climáticos, soportando bien la sequía estival.



DESCRIPCIÓN

Arbusto muy ramoso, con ramas grisáceas de las que parten tallos con espinas. Las hojas, alternas, son de color verde brillante por el haz y blanquecinas por el envés, enteras, de contorno lanceolado. Se disponen a manera de racimos en las ramas. Flores amarillas muy pequeñas, que forman grupos dispuestos en las axilas de las hojas. Cáliz con forma de copa. Los frutos, en baya, son de color amarillo hasta rojo, cuando están maduros.

HÁBITAT

Habita en zonas secas, arenales y zonas soleadas. Requiere un clima mediterráneo de inviernos suaves, pues difícilmente tolera las heladas.

O: Rosales. F: Rhamnaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Esparraguera blanca

Asparagus albus



DESCRIPCIÓN

Arbusto robusto y denso que puede alcanzar 1 m de altura, con el tallo y las ramas muy espinosas, angulares, flexibles (cladodios: ramas muy comprimidas o laminares, de color verde, que, como las hojas, realizan la fotosíntesis), de 12- 20 mm de largo. Con 3-4 ángulos lineales, suaves, ligeramente carnosos, caídos, folíolos de 8-12 completado por una fuerte columna de color blanco. Las flores blancas, fragantes, hermafroditas, con anteras de color violeta aparecen de agosto a octubre. Fructificación invernal.

HÁBITAT

Su hábitat es el matorral termófilo, preferentemente sobre suelos básicos. Crece en colinas secas y soleadas, soportando muy bien los suelos pedregosos. No tolera las heladas fuertes.

O: Asparagales. F: Asparagaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Fresno

Fraxinus angustifolia



DESCRIPCIÓN

Árbol caducifolio que puede alcanzar los 18 m de altura, con copa amplia y tronco de corteza grisácea y rugosa. Hojas opuestas, imparipinnadas, con 7-9 folíolos de forma ovado-lanceolada, con la base entera y finalmente dentados en la mitad superior. Limbo verde claro en el haz, glabro, con pubescencia en los nervios del envés. Peciolos con pelillos. Las flores aparecen al principio de la primavera, dispuestas en densas panículas terminales y axilares. Frutos situados donde empieza la ramita del último año, en sámara linear-lanceolada, truncada oblicuamente.

HÁBITAT

Forman parte de los bosques de ribera con preferencia en terrenos silíceos, donde existe un nivel de agua freática oscilante al cabo del año.

O: Lamiales. F: Oleaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Esparraguera silvestre

Asparagus acutifolius



DESCRIPCIÓN

Arbusto perenne muy ramificado, de hasta 1,5 m de altura. Tallos delgados y verdes, cubierto de ramitas de crecimiento reducido, filiformes y dispuestas en penachos. No tiene hojas sino cladodios (ramas muy comprimidas o laminares que realizan la fotosíntesis). Hojas muy reducidas y espinosas. Se diferencia de otras esparragueras por la gran cantidad de pequeños cladodios de color verde oscuro que cubren casi toda la planta. Florece de agosto a octubre, con flores amarillo-verdosas. Fructificación invernal, con baya negra no comestible. Los brotes jóvenes o espárragos trigueros se consumen, siendo ligeramente amargos.

HÁBITAT

Aparece en lugares abiertos, expuestos, soleados y secos, generalmente formando parte de los matorrales acompañantes de encinares o jarales.

O: Asparagales. F: Asparagaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Jacinto de una hoja

Scilla monophyllos



DESCRIPCIÓN

Herbácea de 10-25 cm que se diferencia de otras "Scillas" porque como su nombre latino indica (monophyllos=una hoja) tiene sólo una hoja lanceolada que envuelve el tallo floral que sostiene en su extremo una inflorescencia abierta, de pequeñas flores. Durante épocas poco favorables se reduce exclusivamente al bulbo u órgano subterráneo de almacenamiento de nutrientes. Florece en otoño y las flores son de color azul claro y pueden mantenerse hasta mediados del invierno.

HÁBITAT

Crece en zonas de matorral o en bosques de ribera en suelos ácidos.

O: Liliales. F: Liliaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Jaras



Plantas que forman parte muy importante de los matorrales mediterráneos. En general son especies de sustitución y pioneras en la recuperación de suelos degradados.

Estepa o jara blanca. *Cistus albidus*

O: Malvales. F: Cistaceae.

E F M A M J J A S O N D

Arbusto de entre 50 y 100 cm de altura, con hojas alargadas y estrechas, de color blanquecino, muy pegajosas y pelosas. Contrariamente a lo que indica su nombre, no tienen flores blancas, sino rosadas, de 5 cm de diámetro y solitarias o en grupos de tres o cuatro, en la terminación de las ramillas. Florece entre febrero y junio. Prefiere terrenos ricos en cal, secos y bien drenados.

Jara negra. *Cistus monspeliensis*

O: Malvales. F: Cistaceae.

E F M A M J J A S O N D

Arbusto que alcanza hasta 1,5 m de altura, de color verde oscuro (de ahí su nombre) viscoso y con un fuerte olor balsámico a ládano. Ramas superiores pelosas. Hojas largas y estrechas, muy rugosas y pegajosas, con envés peloso. Flores de color blanco de cinco pétalos. Florece entre abril y junio. Vive en suelos pobres y a pleno sol y no aguanta las heladas.

Jara pringosa. *Cistus ladanifer*

O: Malvales. F: Cistaceae.

E F M A M J J A S O N D

Arbusto de hasta 2,5 m de altura, cuyas hojas, alargadas y estrechas, están impregnadas de una sustancia olorosa y pegajosa (ládano) a la que debe su nombre. Flores muy grandes (10 cm) con cinco pétalos blancos, generalmente con una mancha rojiza en la base de cada uno. Florece entre abril y mayo. Prefiere sitios secos, soleados y bien drenados.



Jazmín amarillo

DESCRIPCIÓN

Pequeño arbusto trepador que no supera los 2 m de altura. Aunque mantiene sus hojas durante todo el año, en inviernos muy fríos o en zonas muy ramoneadas por herbívoros, sus tallos verdes, angulosos y frágiles aparecen pelados, recordando a los de las escobas (*Cytisus* sp.). Hojas compuestas normalmente por tres hojuelas de 1-2 cm de longitud y color verde intenso. Flor amarilla muy olorosa de 5 lóbulos y forma acampanada que aparece entre marzo y junio. Fruto en baya del tamaño de un guisante y de color marrón-negruzco brillante. Es el único jazmín que crece de forma silvestre en toda Europa, tratándose de una especie relictica de origen tropical que pudo adaptarse al clima mediterráneo surgido tras las glaciaciones.

HÁBITAT

Habita en matorrales, bosques esclerófilos, rocas y pedregales con cierta humedad.



O: Lamiales. F: Oleaceae.

E F M A M J J A S O N D

Labiérnago u Olivilla

DESCRIPCIÓN

Arbusto perennifolio de hasta 2-3 metros de altura, con ramas abundantes, largas y flexibles. Las hojas, verde oscuras, son opuestas, estrechas y con forma de lanza. Flores pequeñas dispuestas en ramilletes en la axila de las hojas, con 4 pétalos blanco-verdosos. Su fruto es carnoso, con uno o dos huesos en su interior; negruzco en la madurez. Florece entre febrero y abril. Su madera es buena para quemar. Se diferencia del labiérnago prieto porque éste presenta hojas más anchas y de borde generalmente aserrado. Su nombre hace referencia a la que se trata de una planta de follaje abundante (del griego phyllon= hoja) y el término angustifolia a sus hojas estrechas.

HÁBITAT

Aparece presente casi constante en bosques y matorrales de cierta termicidad, encinares, alcornoques, madroñales, brezales, jarales, etc.



O: Lamiales. F: Oleaceae.

E F M A M J J A S O N D

Phillyrea angustifolia

Labiérnago prieto o de hoja ancha

Phillyrea latifolia



O: Lamiales. F: Oleaceae.

E F M A My J J A S O N D

DESCRIPCIÓN

Arbusto o arbolillo de hasta 10 m, siempreverde, con una bella corteza cenicienta. Hojas que nacen unas enfrente de otras (opuestas), de color verde botella y forma de punta de lanza con el borde aserrado. Flores minúsculas en ramilletes en las axilas de las hojas. Fruto en forma de drupa redonda negro azulado que recuerda a las aceitunas, aunque del tamaño de un guisante. Se diferencia de la olivilla por presentar hojas más anchas y, del aladierno, por sus hojas opuestas no alternas. Su nombre hace referencia al follaje abundante (del griego phyllon: hoja) y el término latifolia a sus hojas anchas. Su madera ha sido utilizada para la fabricación de barnices y también tiene propiedades astringentes.

HÁBITAT

Aparece en bosques y matorrales de encinares y alcornoques.

Lirio lusitano

Iris lusitanica



DESCRIPCIÓN

Planta herbácea perenne de 40-70 cm de altura que se desarrolla a través de bulbos (órgano subterráneo de almacenamiento de nutrientes). Hojas abrazadoras largas y estrechas, de color verde, situadas a lo largo del tallo. Inconfundible por sus grandes flores de color amarillo con venación algo más oscura. Una hoja (bráctea) verde envuelve el capullo floral. Florece de mayo a junio. Se trata del emblema botánico del Parque Natural, ya que las mejores poblaciones españolas de este endemismo luso-extremadureño se encuentran aquí, entre los afloramientos pizarrosos de los riberos.

HÁBITAT

Se sitúa en suelos neutros a ligeramente ácidos, en comunidades de sotobosques arbustivos de sustitución junto con cantuesos y tomillos; a veces se introduce en zonas boscosas ocupando claros del bosque junto con madroños y jarales.

O: Asparagales. F: Iridaceae.

E F M A My J J A S O N D

Lentisco o charneca

Pistacia lentiscus



O: Sapindales. F: Anacardiaceae

E F M A My J J A S O N D

DESCRIPCIÓN

Arbusto o arbolito de 1 a 5 m de altura, dioico (pie de macho y hembra separados), siempre verde, y con un fuerte olor a resina. Tronco y ramas rojizas y hojas alternas, coriáceas y compuestas paripinnadas (sin foliolo terminal) con 3 o 6 folíolos de un verde intenso. Flores desde amarillentas a rojizas, reunidas en racimos y de tamaño reducido. Fruto pequeño y globoso, con poca carne, al principio rojo y más tarde casi negro, con un hueso en su interior. Sus hojas tienen propiedades astringentes, los frutos pueden proporcionar un aceite utilizado para alumbrar y los troncos exudan una sustancia resinosa utilizada en odontología y la industria de los barnices.

HÁBITAT

Matorrales mediterráneos con predominio del encinar. Resiste mal las heladas por lo que prefiere los lugares más térmicos.

Madreselva

Lonicera implexa



DESCRIPCIÓN

Arbusto trepador y perenne que puede medir hasta 3 m, con tallos largos y flexibles, hojas opuestas, con la base soldada entre ellas y limbo redondeado, son verdes por el haz y blancas por el envés. La corteza es lisa y suele estar cubierta de una capa blanco-azulada. Tallos sarmentosos muy entrelazados (implexos) que se enrollan a árboles y arbustos. Flores reunidas en grupos globosos al final de las ramas, con los pétalos blanco-amarillentos, formando un largo tubo curvado al final del cual aparece un lóbulo inferior más grande y cuatro lóbulos superiores estrechos. Frutos carnosos, de color rojizo y en parte soldados por parejas.

HÁBITAT

Suele aparecer en bosques abiertos, aguanta mejor las sequías que otras especies del género Lonicera.

O: Dipsacales. F: Caprifoliaceae.

E F M A My J J A S O N D



O: Ericales. F: Ericaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN

Arbusto o árbol de hasta 15 m. Presenta corteza pardo-anaranjada escamosa y hojas verdes todo el año con forma de punta de lanza. Flores en ramilletes péndulos de color blanquecino y forma de campanilla y frutos de forma globosa rojo coral cuando maduran. Flores y frutos coinciden en el tiempo. Es muy conocido por su abundante uso ornamental. Los frutos maduros son comestibles y contienen algo de alcohol, destilándose un aguardiente con ellas en algunas zonas, algo a lo que parece aludir su nombre científico "arbusto del que sólo se come un fruto".

HÁBITAT

Especie característica del monte mediterráneo.

DESCRIPCIÓN

Planta herbácea de hasta 50 cm, vivaz, reducida a un bulbo u órgano subterráneo de almacenamiento de nutrientes durante épocas poco favorables. Posee hojas lineales y alternas sobre un tallo fino que brota a finales del invierno y florece en abril. Presenta flores solitarias de gran belleza, colgantes acampanadas con franjas amarillentas y violeta oscuro alternas y en el interior verde amarillento con manchas pardas. El fruto es una cápsula con forma de elipse.

HÁBITAT

Claros de bosque y matorrales y zonas pedregosas soleadas.

O: Liliaceae. F: Liliaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---



O: Rosales. F: Rosaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN

Arbusto o pequeño árbol de 5-10 m de altura, muy ramificado y que pierde la hoja en invierno. Los tallos más jóvenes tienen espinas romas, de 1 a 1,5 cm de largo. Hojas de 2-4 cm de largo y profundamente lobuladas, a veces casi hasta el centro, con los lóbulos abiertos en un amplio ángulo. El haz es verde negruzco y pálido en el envés. Tiene flores blancas que son moderadamente fragantes. El fruto es del tamaño de un guisante, ovals, de color rojo brillante. La madera es dura y se utiliza para objetos pequeños como bastones y mangos de herramientas. Las flores son un excelente tónico del corazón y del aparato circulatorio; son sedantes, antispasmodicas y contribuyen a regular la presión sanguínea.

HÁBITAT

Aunque vive en todos los terrenos es típico de los setos, sotos, ribazos y linderos de los bosques.

DESCRIPCIÓN

Planta herbácea bulbosa, de pequeña talla (hasta 40-50 cm), con hojas estrechas y flores llamativas, olorosas, de color amarillo intenso. Pertenece al género de los narcisos (*Narcissus*), cuya flor se compone normalmente de una parte inferior en forma de tubo, que se abre en su extremo superior formando 6 tépalos o falsos pétalos, sobre los que se dispone una corona o trompeta. En este caso, el tubo es alargado, y la corona acampanada. Florece de febrero a marzo. El bulbo, órgano subterráneo de almacenamiento de nutrientes, se sitúa a bastante profundidad (en torno 10 cm).

HÁBITAT

Suele asentarse preferiblemente en comunidades de jarales y matorrales seriales abiertos.

O: Asparagales.

F: Amaryllidaceae. IE IE

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---



Narciso pálido

Narcissus triandrus subsp. pallidulus



DESCRIPCIÓN

Planta herbácea perenne de 12-25 cm, muy característica dentro del género *Narcissus*. Como el resto de narcisos, se desarrolla a través de bulbos, órganos subterráneos de almacenamiento de nutrientes. Posee hojas lineales dispuestas en la base, con el haz acanalado y el envés estriado. Inconfundible por sus flores (que pueden variar en número de uno a tres) en forma de campanilla colgante y de color amarillo muy pálido. Florece entre febrero y marzo, y como en todas las bulbosas, sus flores desaparecen con cierta rapidez.

HÁBITAT

Suele encontrarse en suelos no muy fértiles y en zonas de rocas silíceas, habitualmente a media sombra en bosques de alcornoque, rebollo y en menor medida de encinar.

O: Asparagales. F: Amaryllidaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Nueza blanca

Bryonia dioica

DESCRIPCIÓN

Es una planta trepadora por medio de los zarcillos que surgen de las axilas de sus hojas, los cuales le permiten adherirse a otras plantas, árboles o soportes; pudiendo alcanzar los tres metros de altura. Posee hojas pentalobuladas que recuerdan a las de la Parra, y flores blancas. El fruto es una baya de color rojo.

HÁBITAT

Vive en bosques más o menos aclarados.

O: Cucurbitales. F: Cucurbitaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---



Orquídeas

Plantas vivaces (la parte subterránea se mantiene viva varios años, renovándose anualmente la parte aérea). Poseen pseudotubérculos, estructuras subterráneas de almacenamiento y reserva de los que brotan las raíces. Dentro del Parque se encuentran 9 de las 40 especies presentes en España, entre las que destacamos:

1. *Ophrys tenthredinifera*.

O: Asparagales. F: Orchidaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Altura de hasta de 30 cm. Florece de febrero a abril. El labelo de las flores se asemeja al abdomen de las abejas. Aparece en bosques soleados y claros de encinares.

2. *Gallos. Serapias lingua*.

O: Asparagales. F: Orchidaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Planta que alcanza 50 cm de altura, aunque normalmente no supera los 25 cm. Florece entre marzo y mayo, con flores de color púrpura violáceo y tonos verdosos, en forma de punta de lanza. Aparece en zonas de pastizales húmedos en primavera.

3. *Serapias perez-chiscanoi*.

O: Asparagales. F: Orchidaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Altura de hasta 35 cm. Es de color verde claro, blanquecino o incluso amarillento con una vena de color púrpura o rosada. Habita en pastizales con cierta humedad, sobre un sustrato arenoso silíceo y riberas de arroyos (preferentemente adheridos).

4. *Orchis morio subsp. picta*.

O: Asparagales. F: Orchidaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Altura de hasta 40 cm. De marzo a abril aparecen sus flores en inflorescencia con tonos entre rosados y violáceos, no siendo raros los ejemplares blancos. Aparece en zonas de matorral y en antiguos olivares pudiendo formar grandes colonias.



Peonía

Paeonia broteroi

DESCRIPCIÓN

Herbácea vivaz, pasa el invierno representada por tallos subterráneos denominados rizomas, y puede alcanzar una altura de hasta 80 cm. Tallos teñidos de rojo y hojas divididas en segmentos con forma oval-lanceolada, verdes, brillantes por el haz y sin pelos en el envés. Aparecen, entre abril y julio, grandes y vistosas flores solitarias, de 6 a 8 pétalos de color rosa chicle y muchos estambres amarillos. En verano dan frutos cubiertos con pelos blanquecinos que contienen semillas rojas primero y negras cuando maduran. Posee gran cantidad de propiedades medicinales aunque a elevadas dosis puede ser tóxica. También es utilizada en jardinería. El nombre del género está dedicado a Paeón, divinidad griega de la medicina.



HÁBITAT

Puede aparecer en la zona sobre suelos frescos y húmedos entre matorral y bosque de encinas y alcornoques.

O: Dilleniales. F: Paeoniaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Quejigo

Quercus faginea

DESCRIPCIÓN

Árbol de tamaño medio (hasta 20 m. de altura) fácil de diferenciar de encinas y alcornoques por sus hojas marcescentes (estado intermedio entre la hoja perenne y la caduca; se vuelve marrón en otoño pero no se cae), menos duras, pinchudas y más grandes que las de sus parientes. Tronco recto con corteza grisácea y muy agrietada. Ramas erguidas que conforman una copa redondeada. Florece entre marzo y abril con flores poco vistosas. Los frutos o bellotas maduran en septiembre del mismo año y son aprovechados como alimento por el ganado. Suele presentar agallas, pequeñas bolas marrones del tamaño de una nuez producidas por la picadura de un insecto en los brotes jóvenes para hacer la puesta, quedando protegidos los huevos por éstas.



O: Fagales. F: Fagaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

HÁBITAT

Se desarrolla sobre todo tipo de suelos, siendo más exigente en humedad que la encina. Forma parte de bosques mixtos junto a alcornoques y encinas.

Píruétano

Pyrus bourgaeana



DESCRIPCIÓN

Arbusto o arbolillo de no más de 5 m de altura y de hoja caduca. Sus fuertes espinas y ramaje abierto le hacen inconfundible. Corteza grisácea que se vuelve anaranjada en algunas ramas. Hojas ovadas o acorazonadas con pecíolo largo. Flores blancas y fruto en forma de pequeña perita globosa muy dura y astringente. Hay que evitar la confusión con ejemplares asilvestrados de Peral común (*Pyrus communis* L.), de mayor porte, menos espinoso y con

peras carnosas. Pese a ser un peral su fruto es incomedible para las personas pero consumido en otoño por gran cantidad de animales. Desde antiguo se ha utilizado a esta especie como patrón para injertar al peral doméstico permitiendo su cultivo en zonas rústicas, y dando lugar a numerosos perales cimarrones.

HÁBITAT

Especie característica de los encinares lusoextremadurenses, donde aparecen de forma dispersa. También es típica de bordes de cursos de agua, incluso en tamujares.

O: Rosales. F: Rosaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Romero

Rosmarinus officinalis

DESCRIPCIÓN

Arbusto verde todo el año de hasta 2 m. de altura. Posee tallos ramificados con hojas duras, lineares y estrechas (3-4 cm de largo por sólo 1-3 mm de ancho) con el margen enrollado hacia afuera. Son verde brillante por el haz y blanquecinas con pelillos por el envés. Florece casi todo el año y las flores son de color azul o violáceo y nacen en racimos. Fruto seco que se divide hasta en cuatro partes globosas y parduzcas. Su nombre parece derivar de las palabras latinas "Ros"=Rocío y "Marinus"=Marino; o del griego "Rhops"=Arbusto y "Myrinos"=Aromático. El epíteto "officinalis" hace referencia a sus características medicinales por sus múltiples propiedades. Además, se usa en la cocina, como planta ornamental para setos y su aceite es utilizado en perfumería.



O: Lamiales. F: Labiatae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

HÁBITAT

Aparece en alcornocales y robledales, así como en los matorrales de su degradación, como madroñales, jarales y brezales.

Escoba blanca. *Cytisus multiflorus*

O: Fabales. F: Fabaceae.

E F M A M y J J I A S O N D

Arbusto de hasta 2 m de altura, con abundantes ramas estriadas y flexibles, de color verde-grisáceas. Las hojas se caen con facilidad. Las flores son blancas y en racimo. El fruto es tipo legumbre aplastada cubierta de pelos, de menos de 3 cm de larga y con semillas ovoides. Se utiliza como ornamental por la gran cantidad de flores que presentan, de ahí su nombre (multiflorus). Aparece en matorrales mediterráneos y en altos pinares.

Escoba negra. *Cytisus scoparius*

O: Fabales. F: Fabaceae.

E F M A M y J J I A S O N D

Arbusto muy ramificado de hasta 2 m de altura, con ramas flexibles y angulosas. Hojas inferiores, compuestas y trifoliadas. Tallos superiores desnudos. Flores amariposadas de color amarillo. Fruto en legumbre aplastada, con pelos sólo en los bordes, de hasta 4 cm de larga, con semillas negras y apéndice carnoso. Usado para la confección de escobas bastas. Propia de matorrales mediterráneos.

Retama. *Retama sphaerocarpa*

O: Fabales. F: Fabaceae.

E F M A M y J J I A S O N D

Arbusto que puede alcanzar 3 m de altura con abundantes ramas estriadas, largas y flexibles, de color gris azulado, hojas simples y prontamente caducas. Las flores, en grupos compuestos, son amarillas y diminutas. El fruto es una legumbre globosa de color pajizo, algo arriñonada, que no se abre y que contiene una sola semilla. Es utilizada para fabricación de escobas. Crece en matorrales de degradación de encinares y pinares.

A pesar de su aspecto hostil, en los roquedos y afloramientos rocosos, habitan gran cantidad de especies en busca de sustento y refugio. Destacan algunas plantas como:

1. Manzanilla yesquera. *Phagnalon saxatile*.

O: Asterales. F: Compositae.

E F M A M y J J I A S O N D

Pequeño arbusto con tallos erectos de color blanquecino, cubiertos de pilosidad lanosa. Hojas lineares con una marcada diferencia de color entre el anverso y el reverso. Flores amarillas solitarias al final de los tallos. Crece en zonas soleadas y secas.

2. Ombligo de Venus. *Umbilicus rupestris*

O: Saxifragales. F: Crassulaceae.

E F M A M y J J I A S O N D

Planta suculenta perenne que debe su nombre a la forma redondeada de sus hojas dispuestas en roseta y con largos pecioloos unidos a la cara inferior de éstas. Inflorescencia de flores colgantes amarillo-verdosas en casi toda su longitud. Vive en zonas húmedas y de umbría.

3. Siemprevivas. *Sedum hirsutum*

O: Saxifragales. F: Crassulaceae.

E F M A M y J J I A S O N D

Planta suculenta, con hojas carnosas en las que almacenan agua, característica por sus flores con blancos pétalos, recorridos por un tenue nervio rojo y sus hojas cubiertas de pelos. Vive en las fisuras de las rocas soleadas.

4. Candilillo. *Arisarum simorhinum*

O: Alismatales. F: Araceae.

E F M A M y J J I A S O N D

Pequeña hierba perenne que recibe su nombre por su característica forma. Lo que aparentemente observamos como flor es una inflorescencia, formada por una gran bráctea en forma de tubo (espata) que envuelve al eje donde se disponen las verdaderas flores.

5. Clavellina de roca. *Dianthus lusitanus*

Caryophyllales. F: Caryophyllaceae.

E F M A M y J J I A S O N D


Hierba perenne con su base leñosa en forma de mata enmarañada y oscura, sobre la que destacan flores rosas (solitarias o en parejas) en el extremo de los tallos.



1.



2.



3.



4.



5.



Rosal silvestre o escaramujo *Rosa canina*

DESCRIPCIÓN

Arbusto sarmentoso de 1 a 3 m de altura, no muy denso pero impenetrable debido a sus tallos y ramas provistos de espinas pequeñas, fuertes y curvas, en forma de diente de perro (de ahí su nombre). Las hojas son caducas, pinnadas y alternas. Las flores de 5 pétalos son grandes (4-5 cm), pedunculadas, de color blanco rosáceo y olorosas, y aparecen entre los meses de mayo y julio. Los frutos, llamados escaramujos, son carnosos y de color rojo carmesí cuando maduran en otoño. Estos son utilizados desde la antigüedad por su poder alimenticio y vitamínico.

HÁBITAT

Se trata de una especie muy común que aparece en los bordes de caminos y senderos.

O: Rosales. F: Rosaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Rusco

DESCRIPCIÓN

Pequeño arbusto de 30 a 80 cm de altura de color verde oscuro, con rizomas subterráneos de los que salen tallos florales masculinos o femeninos, en ambos casos presenta dos tipos de tallos, los normales son lisos y redondeados, mientras que los otros tienen falsas hojas, de forma ovolanceolada de 2 a 3 cm de longitud y acabadas con una punta rígida y punzante. Las hojas verdaderas son muy pequeñas (3-4 mm de longitud), como escamas que normalmente pasan desapercibidas y aparecen en las axilas. Las flores son verdosas aunque poco vistosas. El fruto es una baya rojiza de entre 10 y 15 mm. Posee gran cantidad de propiedades medicinales como diurético, depurativo, antiartítico o antihemorroidal.

HÁBITAT

Bosque y matorrales algo frescos y sombríos, principalmente de encinar.



O: Esparragales. F: Ruscaceae. IE

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Tamujo

DESCRIPCIÓN

Arbusto dioico (pie de macho y hembra separados) de hasta 2m de altura, fuertemente ramificado desde la base, con ramas finas, similares al mimbre, rígidas y algo espinosas. Es caducifolio y sus hojas nacen fasciculadas y al crecer los ramillos quedan en disposición dística, alternas y con la terminación roma o escotada. Flores masculinas solitarias o en grupos de 2-6, erectas y con estambres más largos que el cáliz. Flores femeninas solitarias o en grupos de 2-4, péndulas. Fruto en cápsula, globoso, de color rojizo y dividida en 3 lóbulos. Su madera es muy dura y se ha utilizado esta planta desde antiguo para hacer cercados donde retener el ganado, y sobre todo para la fabricación de escobas duras con las que barrer cuerdas, establos y también las calles.



HÁBITAT

Se cría en las orillas y márgenes de los ríos y arroyos secos.

O: Malpighiales. F: Phyllanthaceae. IE

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Torvisco

DESCRIPCIÓN

Arbusto perenne y ramificado, de hasta 2 m de altura. Ramas delgadas y de color pardo, cubiertas en casi toda su longitud por las hojas. Estas, estrechas, lanceoladas y de tonalidad verdeazulada, se disponen de forma alterna y dirigidas hacia arriba. Desarrolla flores blancas, ligeramente perfumadas, al final del verano y principio del otoño. Fruto carnoso, en baya, primero verde, para pasar a un color rojo o naranja brillante y finalizar siendo negro. Flores y frutos pueden estar presentes al mismo tiempo. La resina de esta planta es irritante, y puede producir ampollas en la piel tras un prolongado contacto.

HÁBITAT

Vive en bosques aclarados y en todo tipo de suelos.

O: Malvales. F: Thymelaeaceae.

E	F	M	A	My	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Daphne gnidium





OFICINA TÉCNICA DEL TAJO INTERNACIONAL

Dirección General de Medio Ambiente

C/ Arroyo Valhondo, n.º 2 - 10071 Cáceres

Tfno.: 927 00 62 25

www.tajotejointernacional.org

<http://extremambiente.juntaex.es/>



Interreg
España - Portugal



UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020."

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio